

カキ

- 1 うどんこ病・・・発生を認めなかった(平年比やや少)。
- 2 炭疽病・・・発生を認めなかった(例年並)。
- 3 カキクダアザミウマ・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 4 カイガラムシ類・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 5 ハダニ類・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 6 その他の病害虫・・・発生を認めなかった。

カキ巡回調査結果（１００葉、５０新梢調査）調査日:令和７年５月１２日 (％)

	うどんこ病		炭疽病		カキクダアザミウマ		カイガラムシ類		ハダニ類	
	発病葉率	ほ場率	発病新梢率	ほ場率	被害葉率	ほ場率	寄生葉率	ほ場率	寄生葉率	ほ場率
京都市 ①	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
〃 ②	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
〃 ③	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
R 7 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
平年比(例年比)	やや少	やや少	(並)	(並)	並	並	並	並	並	並
平年(例年)	1.8	50.0	(0.0)	(0.0)	0.0	0.0	0.03	3.3	0.0	0.0
R 6 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
R 5 年	3.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
R 4 年	3.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
R 3 年	4.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
R 2 年	0.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
R 元年	3.7	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	33.3	0.0	0.0
H 3 0 年	1.0	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H 2 9 年	1.3	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H 2 8 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H 2 7 年	0.3	33.3	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

発生程度別基準

病害虫名	調査項目	無	少	中	多	甚
うどんこ病、落葉病	発病葉率(％)	0	1～10	11～30	31～50	51以上
炭疽病	発病新梢(果)率(％)	0	1～2	3～5	6～10	11以上
チャノキイロアザミウマ カキクダアザミウマ ハマキムシ類 カメムシ類 カキノヘタムシガ カイガラムシ類	被害葉(果)率(％)	0	1～2	3～5	6～10	11以上
ハダニ類	寄生葉率(％)	0	1～15	16～30	31～45	46以上