

カキ

- 1 うどんこ病・・・平年比少なかった。
- 2 落葉病・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 3 炭疽病・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 4 カキクダアザミウマ・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 5 チャノキイロアザミウマ・発生を認めなかった(平年並)。
- 6 カイガラムシ類・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 7 ハダニ類・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 8 カメムシ類・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 9 ハマキムシ類・・・発生を認めなかった(例年並)。
- 10 その他の病害虫・・・発生を認めなかった。

カキ巡回調査結果（１００葉、５０果、５０新梢調査）

調査日：令和７年７月１１日（％）

	うどんこ病		落葉病		炭疽病			カキクダアザミウマ		チャノキイロアザミウマ		カイガラムシ類		ハダニ類		カメムシ類		ハマキムシ類	
	発病葉率	発生ほ場率	発病葉率	発生ほ場率	発病新梢率	発病果率	発生ほ場率	被害果率	発生ほ場率	被害果率	発生ほ場率	寄生果率	発生ほ場率	寄生葉率	発生ほ場率	被害果率	発生ほ場率	被害果率	発生ほ場率
京都市西京区①	3.0		0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
〃 ②	0.0		0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
〃 ③	4.0		0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
R 7 年	2.3	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
平年（例年）比	少	少	並	並	(並)	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	(並)	(並)
	少		並		並			並		並		並		並		並		(並)	
平年（例年）	26.3	100.0	0.0	0.0	(0.0)	0.0	0.0	0.5	10.0	0.4	20.0	0.3	10.0	0.0	0.0	0.3	10.0	(0.0)	(0.0)
R 6 年	10.7	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	33.3	0.0	0.0
R 5 年	15.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
R 4 年	38.7	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
R 3 年	41.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	33.3	0.0	0.0
R 2 年	25.3	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
R 元年	25.3	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H 3 0 年	29.7	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	66.7	2.0	66.7	0.0	0.0	1.3	33.3	0.0	0.0
H 2 9 年	27.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H 2 8 年	18.3	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H 2 7 年	31.7	100.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	5.3	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—

発生程度別基準

病害虫名	調査項目	無	少	中	多	甚
うどんこ病、落葉病	発病葉率(%)	0	1～10	11～30	31～50	51以上
炭疽病	発病新梢(果)率(%)	0	1～2	3～5	6～10	11以上
チャノキイロアザミウマ カキクダアザミウマ ハマキムシ類 カメムシ類 カキノヘタムシガ カイガラムシ類	被害葉(果)率(%)	0	1～2	3～5	6～10	11以上
ハダニ類	寄生葉率(%)	0	1～15	16～30	31～45	46以上