

カンキツ

- 1 そうか病・・・・・・・・・・・・・ 平年比多かった。
- 2 かいよう病・・・・・・・・・・・・・ 発生を認めなかった(平年並)。
- 3 ハダニ類・・・・・・・・・・・・・ 発生を認めなかった(平年並)。
- 4 ヤノネカイガラムシ・・・・・・・・ 発生を認めなかった(平年並)。
- 5 ミカンハモグリガ・・・・・・・・ 平年並であった。

カンキツ巡回調査結果 (100葉調査) 調査日: 令和7年4月15日

調査結果	そうか病		かいよう病		ハダニ類		ヤノネカイガラムシ		ミカンハモグリガ	
	発病度	発生 ほ場率 (%)	発病度	発生 ほ場率 (%)	寄生葉率 (%)	発生 ほ場率 (%)	寄生葉率 (%)	発生 ほ場率 (%)	被害葉率 (%)	発生 ほ場率 (%)
カンキツ①	1.8		0.0		0.0		0.0		0.0	
カンキツ②	0.4		0.0		0.0		0.0		4.0	
カンキツ③	1.0		0.0		0.0		0.0		1.0	
R 7 年	1.1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	66.7
平年比	多	多	並	並	並	並	並	並	並	並
平 年	0.15	10.0	0.0	0.0	1.3	30.0	1.1	21.7	3.4	43.3
R 6 年	1.2	33.3	0.0	0.0	1.3	66.7	0.0	0.0	21.3	100.0
R 5 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
R 4 年	0.1	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	66.7
R 3 年	0.1	33.3	0.0	0.0	2.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
R 2 年	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	33.3	0.3	66.7	0.0	0.0
H 3 1 年	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	66.7	0.0	0.0	5.3	66.7
H 3 0 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
H 2 9 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	50.0	3.5	100.0
H 2 8 年	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	66.7	9.3	100.0	3.3	100.0
H 2 7 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

発生程度別基準

	そうか病、かいよう病		ミカンハダニ	ヤノネカイガラムシ	ミカンハモグリガ
	発病度		寄生葉率 (%)	寄生葉率 (%)	寄生葉率 (%)
無	0		0	0	0
少	1 ～ 1 1		1 ～ 3 0	1 ～ 3	1 ～ 9
中	1 2 ～ 4 5		3 1 ～ 6 0	4 ～ 1 3	1 0 ～ 3 0
多	4 6 ～ 9 0		6 1 ～ 8 0	1 4 ～ 3 0	3 1 ～ 5 0
甚	9 1 以上		8 1 以上	3 1 以上	5 1 以上