

カンキツ

病虫害発生状況

- 1 そうか病・・・・・・・・・・平年比やや多かった。
- 2 かいよう病・・・・・・・・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 3 ハダニ類・・・・・・・・・・発生を認めなかった(平年比やや少)。
- 4 ヤノネカイガラムシ・・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 5 ミカンハモグリガ・・・・平年比多かった。
- 6 アブラムシ類・・・・・・・・・・発生を認めなかった(例年並)。

カンキツ巡回調査結果（１００葉、５０新梢調査）

調査結果	そうか病		かいよう病		ハダニ類
	発病度	ほ場率 (%)	発病度	ほ場率 (%)	寄生葉率 (%)
カンキツ①	4.4	/	0.0	/	0.0
カンキツ②	0.4		0.0		0.0
カンキツ③	3.6		0.0		0.0
Ｒ７年	2.8	100.0	0.0	0.0	0.0
平年比（例年比）	やや多	多	並	並	やや少
平年（例年）	1.03	13.3	0.0	0.0	3.7
Ｒ６年	10.3	100.0	0.0	0.0	0.0

R 5 年	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7
R 4 年	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3
R 3 年	0.1	33.3	0.0	0.0	2.3
R 2 年	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7
R 元年	0.0	0.0	0.0	0.0	23.7
H 3 0 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
H 2 9 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H 2 8 年	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
H 2 7 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7

発生程度別基準

	そうか病、かいよう病	ミカンノミ
	発病度	寄生葉率
無	0	0
少	1 ～ 1 1	1 ～ 3 0
中	1 2 ～ 4 5	3 1 ～ 6 0
多	4 6 ～ 9 0	6 1 ～ 8 0
甚	9 1 以上	8 1 以上

調査日: 令和

二類	ヤノネカイガラムシ		ミカンハモグリガ		アブ:
ほ場率 (%)	寄生葉率 (%)	ほ場率 (%)	被害葉率 (%)	ほ場率 (%)	寄生新梢 率 (%)
	0.0		1.0		0.0
	0.0		13.0		0.0
	0.0		1.0		0.0
0.0	0.0	0.0	5.0	100.0	0.0
やや少	並	並	多	多	(並)
40.0	0.4	13.3	0.2	6.7	(0.9)
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
66.7	0.3	33.3	1.7	33.3	0.0
66.7	3.0	66.7	0.0	0.0	4.0
33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33.3	0.3	33.3	0.0	0.0	0.0
33.3	0.0	0.0	0.3	33.3	—

ハダニ	ヤノネカイガラムシ	ミカンハモグリガ
発生率 (%)	寄生葉率 (%)	寄生葉率 (%)
30	0	0
40	1～3	1～9
50	4～13	10～30
60	14～30	31～50
70以上	31以上	51以上

7年5月14日

ラムシ類
ほ場率 (%)
0.0
(並)
(29.6)
0.0

33.3

33.3

66.7

0.0

100.0

33.3

0.0

0.0

—