

カンキツ

- 1 そうか病 平年比やや多かった。
- 2 かいよう病 発生を認めなかった(平年並)。
- 3 ハダニ類 発生を認めなかった(平年並)。
- 4 ヤノネカイガラムシ 発生を認めなかった(平年並)。
- 5 ミカンハモグリガ 平年比やや多かった。

カンキツ巡回調査結果 (100葉調査)

調査日: 令和8年4月15日

調査結果	そうか病		かいよう病		ハダニ類		ヤノネカイガラムシ		ミカンハモグリガ	
	発病度	発生 ほ場率 (%)	発病度	発生 ほ場率 (%)	寄生葉率 (%)	発生 ほ場率 (%)	寄生葉率 (%)	発生 ほ場率 (%)	被害葉率 (%)	発生 ほ場率 (%)
カンキツ①	1.2	/	0.0	/	0.0	/	0.0	/	2.0	/
カンキツ②	0.2	/	0.0	/	0.0	/	0.0	/	5.0	/
カンキツ③	0.2	/	0.0	/	0.0	/	0.0	/	5.0	/
R 8年	0.5	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	100.0
平年比	並	多	並	並	並	並	並	並	やや多	やや多
平 年	0.3	20.0	0.0	0.0	1.3	30.0	1.1	21.7	3.6	50.0
R 7年	1.1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	66.7
R 6年	1.2	33.3	0.0	0.0	1.3	66.7	0.0	0.0	21.3	100.0
R 5年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
R 4年	0.1	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	66.7
R 3年	0.1	33.3	0.0	0.0	2.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
R 2年	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	33.3	0.3	66.7	0.0	0.0
H 3 1年	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	66.7	0.0	0.0	5.3	66.7
H 3 0年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
H 2 9年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	50.0	3.5	100.0
H 2 8年	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	66.7	9.3	100.0	3.3	100.0

発生程度別基準

	そうか病、かいよう病		ミカンハダニ	ヤノネカイガラムシ	ミカンハモグリガ
	発病度		寄生葉率 (%)	寄生葉率 (%)	寄生葉率 (%)
無	0		0	0	0
少	1~11		1~30	1~3	1~9
中	12~45		31~60	4~13	10~30
多	46~90		61~80	14~30	31~50
甚	91以上		81以上	31以上	51以上