

キャベツ

病害虫発生状況

- 1
- べと病
- 発生を認めなかった（平年並）。
- 2
- 黒腐病
- 発生を認めなかった（平年並）。
- 3
- 菌核病
- 発生を認めなかった（平年並）。
- 4
- アブラムシ類
- 発生を認めなかった（平年比やや少）。
- 5
- モンシロチョウ
- 平年比やや多かった。
- 6
- コナガ
- 発生を認めなかった（平年並）。
- 7
- ハスモンヨトウ
- 平年並であった。
- 8
- ヨトウガ
- 平年比多かった。
- 9
- ウワバ類
- 発生を認めなかった（平年並）。
- 10
- アザミウマ類
- 平年比少なかった。
- 11
- その他の病害虫
- 南区②、弥栄町、久美浜①、②でシロイチモジヨトウの発生を、久美浜町①でオオタバコガの発生を認めた。

発生程度別基準

	調 査 項 目	無	少	中	多	甚
菌 核 病	発病株率（％）	0	1～10	11～20	21～35	36以上
モンシロチョウ	10株当たり幼虫数	0	1～5	6～20	21～40	41以上
コ ナ ガ	10株当たり幼虫・蛹数	0	1～10	11～40	41～100	101以上
ヨ ト ウ ガ	卵・幼虫の寄生株率（％）	0	1～5	6～15	16～30	31以上
アブラムシ類	発生程度	0	1～12	13～25	26～37	38以上
ハスモンヨトウ	寄生株率（％）	0	1～5	6～15	16～30	31以上

※ アブラムシ類発生程度指数
発生程度指数 ＝ （4 A＋3 B＋2 C＋1 D）×25 ／（調査株数）
A：201頭～、B：51～200頭、C：11～50頭、D：1～10頭、E：寄生なし

キャベツ調査結果（25株調査：害虫個体数は10株換算）

調査日：令和7年9月11、16日

調査場所		べと病	黒腐病	菌核病	アブラムシ類					モンシロチョウ		コ ナ ガ		ハスモンヨトウ			ヨトウガ			ウワバ類		アザミウマ類	
		発病株率（％）	発病株率（％）	発病株率（％）	有翅虫数（/10株）	無翅虫数（/10株）	虫数計（/10株）	発生程度指数	寄生株率（％）	幼虫数（/10株）	寄生株率（％）	幼虫・蛹数（/10株）	寄生株率（％）	卵塊数（/10株）	幼虫数（/10株）	寄生株率（％）	卵塊数（/10株）	幼虫数（/10株）	寄生株率（％）	幼虫数（/10株）	寄生株率（％）	寄生株率（％）	被害株率（％）
京都市南区①		0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.40	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	4.0
" ②		0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.40	4.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.40	3.60	24.0	0.00	0.0	0.0	0.0
" ③		0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.80	4.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0
京丹後市弥栄町		0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.40	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0
京丹後市久美浜町①		0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.40	0.00	0.0	0.00	0.40	4.0	0.00	0.0	0.0	0.0
" ②		0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0
平 均	R7年	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.20	1.33	0.00	0.0	0.13	0.00	0.0	0.13	0.67	4.7	0.00	0.0	0.0	0.7
	平年(例年)比	並	並	並	やや少	並	やや少	やや少	やや少	やや多	やや多	並	並	やや多	並	並	多	多	多	並	並	やや少	(少)
	平年(例年)	0.0	0.5	0.0	0.36	0.35	0.71	2.0	4.1	0.08	0.67	0.16	1.4	0.04	0.12	0.6	0.01	0.02	0.2	0.10	1.0	14.4	(16.5)
	R6年	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.20	0.67	0.07	0.7	0.20	0.07	2.0	0.00	0.13	0.7	0.00	0.0	11.3	15.3
	R5年	0.0	0.0	0.0	0.00	0.06	0.06	0.1	0.6	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.91	1.1	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	3.4	10.9
	R4年	0.0	0.0	0.0	0.17	0.91	1.09	0.6	1.7	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.23	1.1	0.00	0.00	0.0	0.11	1.1	9.1	14.9
	R3年	0.0	0.0	0.0	0.20	0.00	0.20	0.3	2.0	0.00	0.00	0.07	0.7	0.00	0.00	0.0	0.07	0.00	0.7	0.07	0.7	0.0	2.7
	R2年	0.0	0.0	0.0	0.40	0.73	1.13	1.5	5.3	0.00	0.00	0.13	1.3	0.07	0.00	0.7	0.00	0.00	0.0	0.07	0.7	0.4	4.0
	R元年	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.40	4.0	0.0	0.0
	H30年	0.0	0.0	0.0	1.20	0.70	1.90	6.0	13.0	0.60	6.00	0.10	1.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.10	1.0	0.40	4.0	53.0	52.0
	H29年	0.0	0.0	0.0	0.13	0.00	0.13	0.7	1.3	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	2.7
	H28年	0.0	0.0	0.0	1.00	0.10	1.10	5.0	9.0	0.00	0.00	0.90	8.0	0.10	0.00	1.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	41.0	46.0
	H27年	0.0	4.8	0.0	0.50	1.00	1.50	6.0	8.0	0.00	0.00	0.30	2.4	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	25.6	—
発 生 ほ場率 (％)	R7年	0.0	0.0	0.0	0.0					33.3		0.0		16.7			33.3			0.0		16.7	
	平年比	並	並	並	やや少					やや多		並		やや多			多			並		少	
	平年	0.0	3.4	0.0	42.3					6.7		11.8		12.0			4.5			16.7		54.8	
	R6年	0.0	0.0	0.0	0.0					16.7		16.7		50.0			16.7			0.0		50.0	
	R5年	0.0	0.0	0.0	14.3					0.0		0.0		14.3			0.0			0.0		57.1	
	R4年	0.0	0.0	0.0	28.6					0.0		0.0		14.3			14.3			28.6		42.9	
	R3年	0.0	14.3	0.0	28.6					0.0		14.3		0.0			14.3			14.3		28.6	
	R2年	0.0	0.0	0.0	66.7					0.0		16.7		16.7			0.0			16.7		16.7	
	R元年	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0		0.0		0.0			0.0			25.0		72.7	
	H30年	0.0	0.0	0.0	100.0					50.0		25.0		0.0			0.0			0.0		100.0	
	H29年	0.0	0.0	0.0	25.0					0.0		0.0		0.0			0.0			0.0		25.0	
	H28年	0.0	0.0	0.0	100.0					0.0		25.0		25.0			0.0			0.0		75.0	
	H27年	0.0	20.0	0.0	60.0					0.0		20.0		0.0			0.0			0.0		80.0	