

キャベツ

病害虫発生状況

- 1

べと病

発生を認めなかった（平年並）。
- 2

黒腐病

平年比やや多かった。
- 3

菌核病

発生を認めなかった（平年並）。
- 4

アブラムシ類

平年並であった。
- 5

モンシロチョウ

発生を認めなかった（平年比やや少）。
- 6

コナガ

平年比多かった。
- 7

ハスモンヨトウ

平年比やや多かった。
- 8

ヨトウガ

平年比やや多かった。
- 9

ウワバ類

発生を認めなかった（平年並）。
- 10

アザミウマ類

平年比やや少なかった。
- 11

その他の病害虫

オオタバコガの発生を南区①、②、久美浜町①で、シロイチモジヨトウの発生を南区②で認めた。

発生程度別基準

	調 査 項 目	無	少	中	多	甚
菌 核 病	発病株率（％）	0	1～10	11～20	21～35	36以上
モンシロチョウ	10株当たり幼虫数	0	1～5	6～20	21～40	41以上
コ ナ ガ	10株当たり幼虫・蛹数	0	1～10	11～40	41～100	101以上
ヨ ト ウ ガ	卵・幼虫の寄生株率（％）	0	1～5	6～15	16～30	31以上
アブラムシ類	発生程度	0	1～12	13～25	26～37	38以上
ハスモンヨトウ	寄生株率（％）	0	1～5	6～15	16～30	31以上

※ アブラムシ類発生程度指数

発生程度指数＝（4A＋3B＋2C＋1D）×25／（調査株数）

A：201頭～、B：51～200頭、C：11～50頭、D：1～10頭、E：寄生なし

キャベツ調査結果（25株調査：害虫個体数は10株換算）

調査日：令和7年10月15、16日

調査場所		べと病	黒腐病	菌核病	アブラムシ類					モンシロチョウ		コ ナ ガ		ハスモンヨトウ			ヨトウガ			ウワバ類		アザミウマ類	
		発病株率 (%)	発病株率 (%)	発病株率 (%)	有翅虫数 (／10株)	無翅虫数 (／10株)	虫数計 (／10株)	発生程度 指数	寄生株率 (%)	幼虫数 (／10株)	寄生株率 (%)	幼虫・蛹数 (／10株)	寄生株率 (%)	卵塊数 (／10株)	幼虫数 (／10株)	寄生株率 (%)	卵塊数 (／10株)	幼虫数 (／10株)	寄生株率 (%)	幼虫数 (／10株)	寄生株率 (%)	寄生株率 (%)	被害株率 (%)
京都市南区①		0.0	0.0	0.0	0.00	2.00	2.00	1.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0
" ②		0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
" ③		0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
京丹後市弥栄町		0.0	0.0	0.0	0.00	0.40	0.04	1.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
京丹後市久美浜町①		0.0	8.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
" ②		0.0	20.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	20.0	0.0	2.8	4.0	0.0	13.6	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
平 均	R 7 年	0.0	4.7	0.0	0.00	0.40	0.34	0.3	1.3	0.0	0.0	0.6	4.7	0.0	0.5	0.7	0.0	2.3	3.3	0.0	0.0	0.7	0.7
	平年(例年)比	並	やや多	並	やや少	並	並	並	並	やや少	やや少	多	多	並	やや多	やや多	並	やや多	やや多	並	並	やや少	(やや少)
	平年 (例年)	0.0	4.4	0.0	0.10	3.02	3.12	1.9	2.8	0.2	1.7	0.1	1.0	0.01	0.2	0.4	0.0	0.8	1.1	0.1	0.7	18.0	(15.9)
	R 6 年	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.6	0.0	0.2	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
	R 5 年	0.0	0.0	0.0	0.08	0.00	0.08	0.2	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0
	R 4 年	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.2	1.7	0.0	0.0	0.1	1.8	1.7	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	8.0	3.4
	R 3 年	0.0	10.7	0.0	0.07	3.20	3.27	1.0	2.7	0.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	
	R 2 年	0.0	6.0	0.0	0.13	0.20	0.33	0.3	1.3	0.7	5.3	0.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	5.3	0.3	3.3	0.0	0.0
	R元年	0.0	0.0	0.0	0.10	1.20	1.30	1.5	2.0	0.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	5.0	0.0	0.0	86.0	80.0
	H 3 0 年	0.0	27.0	0.0	0.10	11.80	11.90	8.8	12.0	0.4	3.0	0.4	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.0	10.0	10.0
	H 2 9 年	0.0	0.0	0.0	0.30	1.70	2.00	1.5	3.0	0.0	0.0	0.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0	39.0
	H 2 8 年	0.0	0.8	0.0	0.20	2.90	3.10	2.8	3.2	0.2	1.6	0.2	2.4	0.0	0.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	9.6
	H 2 7 年	0.0	0.0	0.0	0.00	9.20	9.20	2.8	3.2	0.3	3.2	0.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.8	0.1	0.8	33.6	—
発 生 ほ場率 (%)	R 7 年	0.0	33.3	0.0	33.3					0.0		33.3		16.7			16.7			0.0		16.7	
	平年比	並	やや多	並	並					やや少		多		やや多			やや多			並		やや少	
	平年	0.0	19.5	3.3	30.0					24.7		14.7		6.9			9.5			9.3		57.9	
	R 6 年	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0		40.0		20.0			0.0			0.0		20.0	
	R 5 年	0.0	0.0	0.0	20.0					0.0		0.0		0.0			0.0			0.0		42.9	
	R 4 年	0.0	0.0	0.0	0.0					28.6		0.0		28.6			0.0			14.3		42.9	
	R 3 年	0.0	50.0	16.7	33.3					16.7		0.0		0.0			0.0			0.0		33.3	
	R 2 年	0.0	50.0	16.7	16.7					66.7		16.7		0.0			50.0			33.3		0.0	
	R元年	0.0	0.0	0.0	50.0					25.0		0.0		0.0			25.0			0.0		100.0	
	H 3 0 年	0.0	75.0	0.0	50.0					50.0		25.0		0.0			0.0			25.0		100.0	
	H 2 9 年	0.0	0.0	0.0	50.0					0.0		25.0		0.0			0.0			0.0		100.0	
	H 2 8 年	0.0	20.0	0.0	40.0					40.0		20.0		20.0			0.0			0.0		40.0	
	H 2 7 年	0.0	0.0	0.0	40.0					20.0		20.0		0.0			20.0			20.0		100.0	