

キャベツ

病害虫発生状況

- 1

べと病

発生を認めなかった（平年並）。
- 2

黒腐病

平年並であった。
- 3

菌核病

発生を認めなかった（平年並）。
- 4

アブラムシ類

発生を認めなかった（平年比やや少）。
- 5

モンシロチョウ

発生を認めなかった（平年比やや少）。
- 6

コナガ

発生を認めなかった（平年並）。
- 7

ハスモンヨトウ

発生を認めなかった（平年並）。
- 8

ヨトウガ

発生を認めなかった（平年並）。
- 9

ウワバ類

発生を認めなかった（平年並）。
- 10

アザミウマ類

発生を認めなかった（平年並）。
- 11

その他の病害虫

オオタバコガの発生を南区①、②で認めた。

発生程度別基準

	調 査 項 目	無	少	中	多	基
菌 核 病	発病株率（％）	0	1～10	11～20	21～35	36以上
モンシロチョウ	10株当たり幼虫数	0	1～5	6～20	21～40	41以上
コ ナ ガ	10株当たり幼虫・蛹数	0	1～10	11～40	41～100	101以上
ヨ ト ウ ガ	卵・幼虫の寄生株率（％）	0	1～5	6～15	16～30	31以上
アブラムシ類	発生程度	0	1～12	13～25	26～37	38以上
ハスモンヨトウ	寄生株率（％）	0	1～5	6～15	16～30	31以上

※ アブラムシ類発生程度指数
発生程度指数＝（4A＋3B＋2C＋1D）×25／（調査株数）
A：201頭～、B：51～200頭、C：11～50頭、D：1～10頭、E：寄生なし

キャベツ調査結果（25株調査：害虫個体数は10株換算）

調査場所	べと病	黒腐病	菌核病	アブラムシ類					モンシロチョウ		コ ナ ガ		ハスモンヨトウ			ヨトウガ			ウワバ類		アザミウマ類		
	発病株率 (%)	発病株率 (%)	発病株率 (%)	有翅虫数 (/10株)	無翅虫数 (/10株)	虫数計 (/10株)	発生程度 指数	寄生株率 (%)	幼虫数 (/10株)	寄生株率 (%)	幼虫・蛹数 (/10株)	寄生株率 (%)	卵塊数 (/10株)	幼虫数 (/10株)	寄生株率 (%)	卵塊数 (/10株)	幼虫数 (/10株)	寄生株率 (%)	幼虫数 (/10株)	寄生株率 (%)	寄生株率 (%)	被害株率 (%)	
京都市南区 ①	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
〃 ②	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
京丹後市弥栄町	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
京丹後市久美浜町①	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
〃 ②	0.0	8.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
平 均	R 7 年	0.0	1.6	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	平年(例年)比	並	並	並	並	並	やや少	やや少	やや少	やや少	やや少	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	(並)	
	平年(例年)	0.0	4.7	0.0	0.20	4.99	5.18	2.3	3.6	0.4	3.5	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.3	9.4	(0.7)
	R 6 年	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.3	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	R 5 年	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.3	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	R 4 年	0.0	0.0	0.0	0.20	0.00	0.20	0.5	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	R 3 年	0.0	12.0	0.0	0.64	0.00	0.64	1.6	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	R 2 年	0.0	15.4	0.0	0.23	0.06	0.29	0.7	2.9	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	R元年	0.0	1.0	0.0	0.00	0.10	0.10	0.5	1.0	1.1	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	6.0
	H 3 0 年	0.0	19.0	0.0	0.20	16.30	16.50	9.5	8.0	0.1	1.0	0.2	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	0.0
	H 2 9 年	0.0	0.0	0.0	0.00	0.20	0.20	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	H 2 8 年	0.0	0.0	0.0	0.10	0.00	0.10	0.5	1.0	0.7	4.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	0.0	0.0
H 2 7 年	0.0	0.0	0.1	0.60	33.20	33.80	8.7	12.7	1.7	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.0	57.3	—	
発 生 ほ場率 (%)	R 7 年	0.0	20.0	0.0	0.0					0.0		0.0		0.0			0.0			0.0		0.0	
	平年比	並	やや多	並	やや少					並		並		並			並			並		並	
	平年	0.0	16.4	4.2	41.7					14.3		5.0		5.0			1.4			9.2		35.0	
	R 6 年	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0		25.0		25.0			0.0			50.0		0.0	
	R 5 年	0.0	0.0	0.0	0.0					20.0		0.0		0.0			0.0			0.0		0.0	
	R 4 年	0.0	0.0	0.0	33.3					0.0		0.0		0.0			0.0			0.0		0.0	
	R 3 年	0.0	60.0	0.0	60.0					0.0		0.0		0.0			0.0			0.0		0.0	
	R 2 年	0.0	28.6	0.0	57.1					14.3		0.0		0.0			14.3			0.0		0.0	
	R元年	0.0	75.0	25.0	50.0					25.0		0.0		0.0			0.0			0.0		100.0	
	H 3 0 年	0.0	0.0	0.0	75.0					25.0		25.0		0.0			0.0			0.0		50.0	
	H 2 9 年	0.0	0.0	16.7	50.0					0.0		0.0		0.0			0.0			0.0		100.0	
	H 2 8 年	0.0	0.0	0.0	25.0					25.0		0.0		25.0			0.0			25.0		0.0	
H 2 7 年	0.0	0.0	0.0	66.7					33.3		0.0		0.0			0.0			16.7		100.0		