キャベツ

病害虫発生状況

1　べと病 ・・・・・・・・・・　発生を認めなかった（平年並）。
2　黒腐病 ・・・・・・・・・・　平年比やや多かった。
3　菌核病 ・・・・・・・・・・　平年比多かった。
4　アブラムシ類 ・・・・・・　平年比やや少なかった。
5　モンシロチョウ ・・・・・　発生を認めなかった（平年並）。
6　コナガ ・・・・・・・・・・　発生を認めなかった（平年並）。
7　ハスモンヨトウ ・・・・・　発生を認めなかった（平年並）。
8　ヨトウガ ・・・・・・・・・　平年並であった。
9　ウワバ類 ・・・・・・・・・　平年比やや多かった。
10　アザミウマ類 ・・・・・・　平年比やや少なかった。
11　その他の病害虫 ・・・・・　オオタバコガの発生を京都市南区②で、黒斑病の発生を弥栄町で認めた。

発生程度別基準

	調　査　項　目	無	少	中	多	甚
菌　核　病	発病株率（%）	0	１～１０	１１～２０	２１～３５	３６以上
モンシロチョウ	１０株当たり幼虫数	0	１～５	６～２０	２１～４０	４１以上
コ　ナ　ガ	１０株当たり幼虫・蛹数	0	１～１０	１１～４０	４１～１００	１０１以上
ヨ　ト　ウ　ガ	卵・幼虫の寄生株率（%）	0	１～５	６～１５	１６～３０	３１以上
アブラムシ類	発生程度	0	１～１２	１３～２５	２６～３７	３８以上
ハスモンヨトウ	寄生株率（%）	0	１～５	６～１５	１６～３０	３１以上

※　アブラムシ類発生程度指数
　発生程度指数 ＝ （４Ａ＋３Ｂ＋２Ｃ＋１Ｄ）×２５ ／（調査株数）
　Ａ：201頭～、Ｂ：51～200頭、Ｃ：11～50頭、Ｄ：1～10頭、Ｅ：寄生なし

キャベツ調査結果（２５株調査：害虫個体数は１０株換算）

調査日：令和８年１０月１４、１５日

調査場所		べと病	黒腐病	菌核病	アブラムシ類					モンシロチョウ		コ ナ ガ		ハスモンヨトウ			ヨトウガ			ウワバ類		アザミウマ類	
		発病株率（%）	発病株率（%）	発病株率（%）	有翅虫数（／10株）	無翅虫数（/10株）	虫数計（/10株）	発生程度指数	寄生株率（%）	幼虫数（/10株）	寄生株率（%）	幼虫・蛹数（/10株）	寄生株率（%）	卵塊数（/10株）	幼虫数（/10株）	寄生株率（%）	卵塊数（/10株）	幼虫数（/10株）	寄生株率（%）	幼虫数（/10株）	寄生株率（%）	寄生株率（%）	被害株率（%）
京都市南区①		0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0
〃　②		0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	4.0	0.0	0.0
京丹後市弥栄町		0.0	4.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
京丹後市久美浜町①		0.0	12.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
京丹後市久美浜町②		0.0	4.0	4.0	0.00	0.40	0.40	1.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
平　均	Ｒ８年	0.0	4.0	0.8	0.00	0.08	0.08	0.2	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	0.1	0.8	0.0	1.6
	平年比	並	並	多	やや少	やや少	やや少	やや少	やや少	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	やや多	やや多	やや少	並
	平年	0.0	4.9	0.0	0.10	2.14	2.23	1.6	2.6	0.2	1.3	0.2	1.4	0.01	0.2	0.5	0.0	1.0	1.4	0.1	0.6	14.7	14.4
	Ｒ７年	0.0	4.7	0.0	0.00	0.40	0.34	0.3	1.3	0.0	0.0	0.6	4.7	0.0	0.5	0.7	0.0	2.3	3.3	0.0	0.0	0.7	0.7
	Ｒ６年	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.6	0.0	0.2	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
	Ｒ５年	0.0	0.0	0.0	0.08	0.00	0.08	0.2	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0
	Ｒ４年	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.2	1.7	0.0	0.0	0.1	1.8	1.7	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	8.0	3.4
	Ｒ３年	0.0	10.7	0.0	0.07	3.20	3.27	1.0	2.7	0.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7
	Ｒ２年	0.0	6.0	0.0	0.13	0.20	0.33	0.3	1.3	0.7	5.3	0.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	5.3	0.3	3.3	0.0	0.0
	Ｒ元年	0.0	0.0	0.0	0.10	1.20	1.30	1.5	2.0	0.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	5.0	0.0	0.0	86.0	80.0
	Ｈ３０年	0.0	27.0	0.0	0.10	11.80	11.90	8.8	12.0	0.4	3.0	0.4	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.0	10.0	10.0
	Ｈ２９年	0.0	0.0	0.0	0.30	1.70	2.00	1.5	3.0	0.0	0.0	0.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0	39.0
	Ｈ２８年	0.0	0.8	0.0	0.20	2.90	3.10	2.8	3.2	0.2	1.6	0.2	2.4	0.0	0.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	9.6
発生ほ場率（%）	Ｒ８年	0.0	60.0	20.0	20.0					0.0		0.0		0.0			20.0			20.0		20.0	
	平年比	並	やや多	多	並					並		並		並			やや多			やや多		やや少	
	平年	0.0	22.8	3.3	29.3					22.7		16.0		8.5			9.2			7.3		49.6	
	Ｒ７年	0.0	33.3	0.0	33.3					0.0		33.3		16.7			16.7			0.0		16.7	
	Ｒ６年	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0		40.0		20.0			0.0			0.0		20.0	
	Ｒ５年	0.0	0.0	0.0	20.0					0.0		0.0		0.0			0.0			0.0		42.9	
	Ｒ４年	0.0	0.0	0.0	0.0					28.6		0.0		28.6			0.0			14.3		42.9	
	Ｒ３年	0.0	50.0	16.7	33.3					16.7		0.0		0.0			0.0			0.0		33.3	
	Ｒ２年	0.0	50.0	16.7	16.7					66.7		16.7		0.0			50.0			33.3		0.0	
	Ｒ元年	0.0	0.0	0.0	50.0					25.0		0.0		0.0			25.0			0.0		100.0	
	Ｈ３０年	0.0	75.0	0.0	50.0					50.0		25.0		0.0			0.0			25.0		100.0	
	Ｈ２９年	0.0	0.0	0.0	50.0					0.0		25.0		0.0			0.0			0.0		100.0	
	Ｈ２８年	0.0	20.0	0.0	40.0					40.0		20.0		20.0			0.0			0.0		40.0	