

キュウリ

病害虫発生状況

1	べと病	発生を認めなかった（平年並）。
2	うどんこ病	発生を認めなかった（平年並）。
3	斑点細菌病	発生を認めなかった（平年並）。
4	褐斑病	発生を認めなかった（平年並）。
5	モザイク病	発生を認めなかった（平年並）。
6	灰色かび病	果実がなく調査しなかった。
7	アブラムシ類	発生を認めなかった（平年比少）。
8	ハダニ類	発生を認めなかった（平年並）。
9	ハモグリバエ類	発生を認めなかった（平年並）。
10	アザミウマ類	平年並の発生であった。
11	コナジラミ類	発生を認めなかった（平年並）。
12	ハスモンヨトウ	発生を認めなかった（平年並）。
13	ワタヘリクロノメイガ	発生を認めなかった（平年並）。
14	その他の病害虫	全ての地点でウリハムシの発生を認めた。

発生程度別基準

	調査項目	無	少	中	多	甚
べと病	発病葉率(%)	0	1～25	26～50	51～75	76以上
うどんこ病	発病葉率(%)	0	1～25	26～50	51～75	76以上
斑点細菌病	発病葉率(%)	0	1～25	26～50	51～75	76以上
モザイク病	発病株率(%)	0	1～20	21～40	41～70	71以上
アブラムシ類	1葉当たり寄生虫数	0	1～10	11～50	51～200	201以上

キュウリ巡回調査結果（25株・2葉・4果調査）

調査日：令和7年5月15日

調査場所		べ と 病		うどんこ病		斑点細菌病		褐斑病		モザイク病		灰色かび病		アブラムシ類		ハダニ類		ハモグリバエ類		アザミウマ類		コナジラミ類		ハスモンヨトウ		ワタハリクロノメイガ	
		発病葉率 (%)	発病株率 (%)	発病葉率 (%)	発病株率 (%)	発病葉率 (%)	発病株率 (%)	発病葉率 (%)	発病株率 (%)	発病葉率 (%)	発病株率 (%)	発病葉率 (%)	発病株率 (%)	寄生虫数 (/葉)	寄生葉率 (%)	寄生虫数 (/葉)	寄生葉率 (%)	被害葉率 (%)	被害株率 (%)	寄生虫数 (/葉)	寄生葉率 (%)	成虫数 (/葉)	寄生葉率 (%)	寄生株率 (%)	被害株率 (%)	寄生株率 (%)	
京都市伏見区 ①		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
〃 ②		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.50	68.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0
〃 ③		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.62	34.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0
平 均	R 7 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.04	34.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0
	平年比	並	並	並	並	並	並	並	並	並	—	—	少	少	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	
	平 年	0.1	0.1	0.0	0.0	0.5	1.0	0.1	2.5	0.0	0.0	0.0	0.03	3.0	0.066	2.3	0.0	0.0	0.98	34.7	0.005	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
	R 6 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.013	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	
	R 5 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.07	4.7	0.58	16.0	0.0	0.0	1.71	50.7	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	R 4 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.05	4.7	0.03	2.7	0.0	0.0	2.28	60.7	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	R 3 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.01	0.7	0.00	0.0	0.0	0.0	1.58	58.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	R 2 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.09	6.0	0.00	0.0	0.0	0.0	1.64	47.3	0.013	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	
	R 元年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	23.0	0.0	0.0	—	0.01	1.0	0.01	0.5	0.0	0.0	1.00	29.5	0.010	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
	H 3 0 年	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	9.0	0.0	1.0	0.0	0.0	—	0.03	3.5	0.03	0.5	0.0	0.0	0.76	32.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	H 2 9 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.02	4.7	0.02	3.3	0.0	0.0	0.24	30.7	0.003	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
	H 2 8 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.04	2.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.19	14.0	0.010	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
	H 2 7 年	0.7	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.3	0.0	0.0	—	0.03	3.3	0.00	0.0	0.0	0.0	0.40	24.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
発 生 ほ場率 (%)	R 7 年	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	—		0.0		0.0		0.0		66.7		0.0		0.0		0.0	0.0	
	平年比	並		並		並		並		並	—		少		並		並		やや少		並		並		並	並	
	平 年	3.3		0.0		10.8		10.8		0.0	0.0		62.5		21.7		0.0		90.0		15.8		0.0		0.0	0.0	
	R 6 年	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		33.3		0.0		0.0	0.0	
	R 5 年	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	0.0		66.7		66.7		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0	0.0	
	R 4 年	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	0.0		100.0		66.7		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0	0.0	
	R 3 年	0.0		0.0		33.3		0.0		0.0	0.0		33.3		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0	0.0	
	R 2 年	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	0.0		100.0		0.0		0.0		100.0		33.3		0.0		0.0	0.0	
	R 元年	0.0		0.0		0.0		50.0		0.0	0.0		50.0		25.0		0.0		100.0		25.0		0.0		0.0	0.0	
	H 3 0 年	0.0		0.0		75.0		25.0		0.0	0.0		75.0		25.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0	0.0	
	H 2 9 年	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	0.0		100.0		33.3		0.0		100.0		33.3		0.0		0.0	0.0	
	H 2 8 年	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	0.0		33.3		0.0		0.0		100.0		33.3		0.0		0.0	0.0	
	H 2 7 年	33.3		0.0		0.0		33.3		0.0	0.0		66.7		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0	0.0	