

キュウリ（露地）

病害虫発生状況

- 1 ベと病 発生を認めなかった（平年並）。
- 2 炭疽病 平年比多かった。
- 3 うどんこ病 発生を認めなかった（平年並）。
- 4 斑点細菌病 発生を認めなかった（平年並）。
- 5 褐斑病 平年比やや多かった。
- 6 モザイク病 発生を認めなかった（平年並）。
- 7 灰色かび病 発生を認めなかった（例年並）。
- 8 アブラムシ類 発生を認めなかった（平年並）。
- 9 ハダニ類 発生を認めなかった（平年並）。
- 10 ハモグリバエ類 発生を認めなかった（平年並）。
- 11 アザミウマ類 発生を認めなかった（平年並）。
- 12 コナジラミ類 平年比やや多かった。虫種はタバココナジラミ。
- 13 ワタヘリクロノメイガ 発生を認めなかった（例年並）。
- 14 その他の病害虫 発生を認めなかった。

発生程度別基準

	調査項目	無	少	中	多	甚
ベ と 病	発病葉率 (%)	0	1～25	26～50	51～75	76以上
うどんこ病	発病葉率 (%)	0	1～25	26～50	51～75	76以上
斑点細菌病	発病葉率 (%)	0	1～25	26～50	51～75	76以上
褐斑病	発病葉率 (%)	0	1～5	6～25	26～50	51以上
モザイク病	発病株率 (%)	0	1～20	21～40	41～70	71以上
灰色かび病	発病株率 (%)	0	1～2	3～5	6～20	21以上
	発病果率 (%)	0	1～5	6～10	11～30	31以上
アブラムシ類	1葉当たり寄生虫数	0	1～10	11～50	51～200	201以上
ハダニ類	1葉当たり寄生虫数	0	1～2	3～10	11～50	51以上
	寄生葉率 (%)	0	1～25	26～50	51～75	76以上
アザミウマ類	1葉当たり寄生虫数	0	1～25	26～50	51～75	76以上
	寄生葉率 (%)	0	1～5	6～20	21～50	51以上
コナジラミ類 (成虫)	1葉当たり寄生虫数	0	0.01～10	11～30	31～100	101以上
	寄生葉率 (%)	0	1～30	31～50	51～80	81以上

キュウリ巡回調査結果（25株の2葉、4果調査）

調査日：令和7年8月15日

調査場所		ベ と 病		炭 疽 病		うどんこ病		斑点細菌病		褐 斑 病		モザイク病	灰色かび病		アブラムシ類		ハダニ類		ハモグリバエ類		アザミウマ類		コナジラミ類		ワタヘリクロノメイガ
		発病葉率 (%)	発病株率 (%)	発病葉率 (%)	発病株率 (%)	発病葉率 (%)	発病株率 (%)	発病葉率 (%)	発病株率 (%)	発病葉率 (%)	発病株率 (%)	発病株率 (%)	発病株率 (%)	発病果率 (%)	寄生虫数 (/葉)	寄生率 (%)	寄生虫数 (/葉)	寄生率 (%)	被害葉率 (%)	被害株率 (%)	寄生虫数 (/葉)	寄生率 (%)	成虫数 (/葉)	寄生率 (%)	寄生株率 (%)
宇治田原町 ①		0.0	0.0	2.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.34	16.0	0.0
〃 ②		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.00	0.0	0.0
平 均	R 7 年	0.0	0.0	1.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.17	8.0	0.0
	平年(例年)比	並	並	多	多	並	並	並	並	多	やや多	並	(並)	(並)	並	並	並	並	並	並	並	並	多	多	(並)
	平年(例年)	1.1	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	6.4	0.0	(0.0)	(0.0)	0.00	0.0	0.19	1.8	0.1	2.4	0.002	0.2	0.02	1.5	(0.3)
	R 6 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	1.10	3.0	0.0	0.0	0.010	1.0	0.04	4.0	0.0
	R 5 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.54	12.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.04	4.0	0.0
	R 4 年	5.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.05	3.0	0.0
	R 3 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.20	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.02	2.0	2.0
	R 2 年	4.0	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.10	2.0	0.0	14.0	0.000	0.0	0.01	1.0	0.0
	R 元年	2.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	6.0	0.010	1.0	0.00	0.0	0.0
	H 3 0 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.00	0.0	0.0
	H 2 9 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.01	1.0	0.0
	H 2 8 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	2.0	0.000	0.0	0.00	0.0	—
	H 2 7 年	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	12.0	0.0	—	—	0.00	0.0	0.00	0.0	1.0	2.0	0.000	0.0	0.00	0.0	—
発 生 ほ場率 (%)	R 7 年	0.0		50.0		0.0		0.0		50.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		50.0		0.0
	平年(例年)比	並		多		並		並		やや多		並	(並)		並		並		並		並		並		(並)
	平年(例年)	20.0		0.0		0.0		0.0		15.0		0.0	(0.0)		0.0		20.0		25.0		10.0		35.0		(6.3)
	R 6 年	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	0.0		0.0		50.0		0.0		50.0		100.0		0.0
	R 5 年	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	0.0		0.0		50.0		0.0		0.0		50.0		0.0
	R 4 年	50.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		50.0		0.0
	R 3 年	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	0.0		0.0		50.0		0.0		0.0		50.0		50.0
	R 2 年	50.0		0.0		0.0		0.0		50.0		0.0	0.0		0.0		50.0		100.0		0.0		50.0		0.0
	R 元年	50.0		0.0		0.0		0.0		50.0		0.0	0.0		0.0		0.0		50.0		50.0		0.0		0.0
	H 3 0 年	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
	H 2 9 年	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		50.0		0.0
	H 2 8 年	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	—		0.0		0.0		50.0		0.0		0.0		—
	H 2 7 年	50.0		0.0		0.0		0.0		50.0		0.0	—		0.0		0.0		50.0		0.0		0.0		—