

ムギ

病害虫等発生状況

二条大麦

- 1 赤かび病・・・発生を認めなかった（平年並）。
- 2 その他の病害虫・・・発生を認めなかった。

小麦

- 1 赤かび病・・・発生を認めなかった（平年並）。
- 2 うどんこ病・・・発生を認めなかった（例年並）。
- 3 黄斑症状・・・75%のほ場で認めた（例年比やや少）。
- 4 その他の病害虫・・・発生を認めなかった。

表1 二条大麦調査結果
(調査日:令和7年5月15日)

		赤かび病	
		発病穂率 (%)	発病度
亀岡市	①	0.0	0.0
	②	0.0	0.0
	③	0.0	0.0
	④	0.0	0.0
	⑤	0.0	0.0
	⑥	0.0	0.0
平 均	R7年	0.0	0.0
	平年比	並	並
	平年	0.1	0.0
	R6年	0.0	0.0
	R5年	0.0	0.0
	R4年	0.0	0.0
	R3年	0.0	0.0
	R2年	0.0	0.0
	R元年	0.0	0.0
	H30年	0.7	0.1
	H29年	0.0	0.0
	H28年	0.0	0.0
	H27年	0.0	0.0
確 認 ほ 場 率 (%)	R7年	0.0	
	平年比	並	
	平年	1.7	
	R6年	0.0	
	R5年	0.0	
	R4年	0.0	
	R3年	0.0	
	R2年	0.0	
	R元年	0.0	
	H30年	16.7	
	H29年	0.0	
	H28年	0.0	
	H27年	0.0	

表2 小麦調査結果(調査日:令和7年5月12日)

		赤かび病		うどんこ病		黄斑症状	
		発病穂率 (%)	発病度	病斑面積率 (%)	発病茎率 (%)	斑点面積 率(%)	被害茎率 (%)
福知山市	①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0
	②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0
	③	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00	100.0
	④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.12	12.0
	⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	2.44	100.0
	⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00	100.0
綾部市	①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.68	68.0
	②	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00	100.0
平 均	R7年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.78	60.0
	平年比(例年比)	並	並	(並)	(並)	(少)	(並)
	平年(例年)	0.3	0.1	(0.6)	(2.9)	(8.3)	(71.3)
	R6年	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	94.0
	R5年	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	97.6
	R4年	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	69.2
	R3年	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	54.8
	R2年	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	40.8
	R元年	2.0	0.3	4.4	22.8	-	-
	H30年	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
	H29年	0.7	0.1	0.0	0.0	-	-
	H28年	0.0	0.0	-	-	-	-
	H27年	0.4	0.1	-	-	-	-
確 認 ほ 場 率 (%)	R7年	0.0		0.0		75.0	
	平年比(例年比)	並		(並)		(少)	
	平年(例年)	6.7		(5.6)		(92.7)	
	R6年	0.0		0.0		100.0	
	R5年	10.0		0.0		100.0	
	R4年	0.0		0.0		80.0	
	R3年	0.0		0.0		100.0	
	R2年	0.0		0.0		83.3	
	R元年	30.0		50.0		-	
	H30年	0.0		0.0		-	
	H29年	16.7		0.0		-	
	H28年	0.0		0.0		-	
	H27年	10.0		-		-	

(程度別基準)

	程 度	無	少	中	多	甚
赤かび病	発病穂率(%)	0	1~40	41~60	61~80	81以上
うどんこ病	病斑面積率(%)	0	1~4	5~8	9~16	17以上