

果樹の病害虫

ナシ  
病害虫等発生状況

- 1 黒斑病・・・・・・・・・・平年並であった。
- 2 黒星病・・・・・・・・・・平年比やや少なかった。
- 3 赤星病・・・・・・・・・・発生を認めなかった(平年比やや少)。
- 4 うどんこ病・・・・・・・・発生を認めなかった(平年比やや少)。
- 5 ハダニ類・・・・・・・・・・平年並であった。
- 6 アブラムシ類・・・発生を認めなかった(例年並)。
- 7 ハマキムシ類・・・発生を認めなかった(例年並)。
- 8 シンクイムシ類・・・発生を認めなかった。
- 9 カイガラムシ類・・・発生を認めなかった。
- 10 その他の病害虫・・・一部のほ場でハスモンヨトウの卵塊、カメムシ類を確認した。

	黒斑病	黒星病	赤星病	うどんこ病	ハダニ類	アブラムシ類	ハマキムシ類	カメムシ類 シンクイムシ類 カイガラムシ類
	発病葉率	発病葉率	発病葉率	発病葉率	寄生葉率	寄生新梢率	被害新梢率	被害果率
無 少 中 多 甚	0	0	0	0	0	0	0	0
	1～5	1～5	1～5	1～5	1～15	1～5	1～2	1～2
	6～15	6～15	6～15	6～15	16～30	6～15	3～5	3～5
	16～30	16～30	16～30	16～30	31～45	16～30	6～10	6～10
	31以上	31以上	31以上	31以上	46以上	31以上	11以上	11以上

ナシ巡回調査結果(100葉調査)

調査: 令和7年8月13、14日

(96)

調査結果	種類*	黒斑病		黒星病		赤星病		うどんこ病		ハダニ類		アブラムシ類		ハマキムシ類		シンクイムシ類		カイガラムシ類		備考
		発病葉率	ほ場率	発病葉率	ほ場率	発病葉率	ほ場率	発病葉率	ほ場率	寄生葉率	ほ場率	寄生新梢率	ほ場率	被害新梢率	ほ場率	被害果率	ほ場率	被害果率	ほ場率	
京丹後市久美浜町①	二十	1.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		-		-		ハスモンヨトウ卵塊
〃 ②	〃	6.0				0.0		0.0		1.0		0.0		0.0		1.0		-		
〃 ③	〃	15.0				0.0		0.0		3.0		0.0		0.0		-		-		
京丹後市網野町 ①	〃	10.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		-		-		
〃 ②	〃	8.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		-		-		
〃 ③	赤			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		-		-		
京丹後市久美浜町④	〃			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		-		-		ハスモンヨトウ卵塊 カメムシ類
〃 ⑤	〃			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		-		-		
八幡市	〃			3.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		
京丹後市久美浜町⑥	ゴ	5.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		-		-		
R7年		8.0	100.0	0.8	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	
平年比(例年比)		並	並	少	やや少	やや少	やや少	やや少	やや少	並	やや少	(並)	(並)	(並)	(並)	-	-	-	-	
		並		やや少		やや少		やや少		並		(並)		(並)		-		-		
平年(例年)		8.7	92.0	5.1	49.0	0.2	13.7	1.7	19.1	7.8	47.3	(0.03)	(2.0)	(0.0)	(0.0)	0.04	1.8	-	-	
R6年		11.6	100.0	1.8	50.0	0.1	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
R5年		16.2	100.0	13.6	80.0	0.3	27.3	0.0	0.0	0.2	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
R4年		15.4	100.0	12.0	20.0	0.1	9.1	0.1	9.1	0.4	27.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	
R3年		5.8	100.0	5.4	80.0	0.1	9.1	0.1	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	
R2年		10.4	100.0	4.4	40.0	0.2	18.2	0.6	45.5	0.4	27.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	
R元年		3.2	80.0	4.2	80.0	0.8	27.3	0.5	18.2	12.5	90.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	
H30年		10.8	100.0	4.4	60.0	0.3	27.3	5.7	27.3	15.5	72.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	
H29年		5.6	100.0	3.0	20.0	0.0	0.0	1.9	27.3	13.5	54.5	0.1	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	
H28年		5.2	80.0	1.0	20.0	0.2	9.1	2.8	27.3	13.0	100.0	0.2	9.1	0.0	0.0	0.4	18.2	-	-	
H27年		3.0	60.0	1.2	40.0	0.0	0.0	5.1	27.3	22.4	81.8	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	

\*二十: 二十世紀、赤: 幸水、豊水等、ゴ: ゴールド二十世紀

\*黒斑病の発病葉率及び発生ほ場率は二十世紀のみで算出し、ゴールド二十世紀は含めていない。