

果樹の病害虫

ナシ

- 1 黒斑病・・・平年比やや多かった。
- 2 黒星病・・・平年比やや多かった。
- 3 赤星病・・・発生を認めなかった(平年比やや少)。
- 4 うどんこ病・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 5 ハダニ類・・・平年比やや多かった。
- 6 アブラムシ類・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 7 ハマキムシ類・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 8 カメムシ類・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 9 シンクイムシ類・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 10 カイガラムシ類・・・発生を認めなかった。

	黒斑病	黒星病	赤星病	うどんこ病	ハダニ類	アブラムシ類	ハマキムシ類	カメムシ類 シンクイムシ類 カイガラムシ類
	発病葉率	発病葉率	発病葉率	発病葉率	寄生葉率	寄生新梢率	被害新梢率	被害果率
無 少 中 多 甚	0	0	0	0	0	0	0	0
	1～5	1～5	1～5	1～5	1～15	1～5	1～2	1～2
	6～15	6～15	6～15	6～15	16～30	6～15	3～5	3～5
	16～30	16～30	16～30	16～30	31～45	16～30	6～10	6～10
	31以上	31以上	31以上	31以上	46以上	31以上	11以上	11以上

ナシ巡回調査結果（100葉、50果、50新梢調査）調査日：令和8年7月15、16日（%）

調査結果	種類*	黒斑病		黒星病		赤星病		うどんこ病		ハダニ類		アブラムシ類		ハマキムシ類		カメムシ類		シンクイムシ類		カイガラムシ類		備考
		発病葉率	ほ場率	発病葉率	ほ場率	発病葉率	ほ場率	発病葉率	ほ場率	寄生葉率	ほ場率	寄生新梢率	ほ場率	被害新梢率	ほ場率	被害果率	ほ場率	被害果率	ほ場率	被害果率	ほ場率	
京丹後市久美浜町①	二十	8.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		-		-		-		
〃 ②	〃	28.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		-		-		-		
京丹後市網野町 ①	〃	7.0				0.0		0.0		16.0		0.0		0.0		-		-		-		
〃 ②	〃	9.0				0.0		0.0		10.0		0.0		0.0		-		-		-		
〃 ③	赤			12.0		0.0		0.0		48.0		0.0		0.0		-		-		-		
京丹後市久美浜町③	〃			6.0		0.0		0.0		4.0		0.0		0.0		-		-		-		
〃 ④	〃			6.0		0.0		0.0		26.0		0.0		0.0		-		-		-		
八幡市	〃			1.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		
京丹後市久美浜町⑤	ゴ	6.0				0.0		0.0		1.0		0.0		0.0		-		-		-		
京丹後市久美浜町⑥	〃	6.0				0.0		0.0		28.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		
R8年		13.0	100.0	6.3	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
平年比		やや多	並	やや多	多	やや少	やや少	並	並	やや多	多	並	並	並	並	並	並	並	並	-	-	
		やや多		やや多		やや少		並		やや多		並		並		並		並		-		
平年		9.1	82.0	5.0	51.0	0.6	14.7	0.6	6.4	5.1	28.6	0.04	0.9	0.06	2.7	1.0	5.0	0.0	0.0	-	-	
R7年		8.6	100.0	2.0	50.0	0.2	10.0	0.0	0.0	9.5	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
R6年		10.8	100.0	0.0	0.0	0.3	10.0	0.0	0.0	0.3	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
R5年		15.4	100.0	13.6	60.0	0.1	9.1	0.0	0.0	0.1	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
R4年		17.6	100.0	9.8	60.0	1.1	18.2	0.0	0.0	30.0	72.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	
R3年		5.4	100.0	7.0	60.0	0.7	18.2	0.0	0.0	0.5	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	
R2年		8.6	60.0	4.2	80.0	0.6	18.2	0.7	27.3	5.8	54.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	
R元年		3.2	80.0	4.4	80.0	2.2	45.5	0.3	18.2	0.4	18.2	0.0	0.0	0.2	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	
H30年		5.0	60.0	4.8	80.0	0.5	18.2	5.2	9.1	2.5	27.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	
H29年		3.0	60.0	3.4	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	27.3	0.0	0.0	0.2	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	
H28年		13.6	60.0	1.0	20.0	0.0	0.0	0.1	9.1	0.6	18.2	0.4	9.1	0.2	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	

*二十：二十世紀、赤：幸水、豊水等、ゴ：ゴールド二十世紀
*黒斑病の発病葉率及び発生ほ場率は二十世紀のみで算出し、ゴールド二十世紀は含めていない。