果樹の病害虫

ナシ

１　黒斑病・・・・・・平年並であった。
２　黒星病・・・・・・平年並であった。
３　赤星病・・・・・・発生を認めなかった(平年並)。
４　うどんこ病・・・・平年並であった。
５　ハダニ類・・・・・平年並であった。
６　その他の病害虫・・一部のほ場でハスモンヨトウの卵塊を確認した。

ナシ巡回調査結果（１００葉調査）　　調査：令和８年１０月１４日　（%）

調査結果	種類*	黒斑病		黒星病		赤星病		うどんこ病		ハダニ類	
		発病葉率	ほ場率	発病葉率	ほ場率	発病葉率	ほ場率	発病葉率	ほ場率	寄生葉率	ほ場率
京丹後市久美浜町①	二十	16.0				0.0		0.0		0.0	
〃　②	〃	24.0				0.0		3.0		0.0	
京丹後市網野町　①	〃	15.0				0.0		33.0		0.0	
〃　②	〃	15.0				0.0		5.0		0.0	
〃　③	赤			9.0		0.0		12.0		0.0	
京丹後市久美浜町③	〃			0.0		0.0		0.0		0.0	
〃　④	〃			0.0		0.0		4.0		7.0	
八幡市	〃			13.0		0.0		6.0		0.0	
京丹後市久美浜町⑤	ゴ	0.0				0.0		10.0		0.0	
京丹後市久美浜町⑥	〃	11.0				0.0		3.0		5.0	
Ｒ８年		17.5	100.0	5.5	50.0	0.0	0.0	7.6	80.0	1.2	20.0
平年比		並	並	並	並	並	並	やや少	並	並	やや少
		並		並		並		並		並	
平　年		20.4	92.3	5.1	53.0	0.01	0.9	18.3	70.4	1.1	33.1
Ｒ７年		23.4	100.0	9.8	100.0	0.0	0.0	10.4	20.0	0.0	0.0
Ｒ６年		19.8	80.0	6.5	50.0	0.0	0.0	2.4	30.0	0.7	40.0
Ｒ５年		20.0	100.0	8.5	80.0	0.0	0.0	10.2	63.4	0.1	9.1
Ｒ４年		22.3	83.3	5.2	20.0	0.0	0.0	11.8	81.8	0.5	27.3
Ｒ３年		10.2	80.0	5.4	40.0	0.0	0.0	17.2	90.9	1.8	63.6
Ｒ２年		13.4	100.0	4.8	80.0	0.0	0.0	2.0	54.5	2.1	54.5
Ｒ元年		11.8	100.0	3.0	60.0	0.1	9.0	28.9	90.9	2.2	45.5
Ｈ３０年		27.6	100.0	5.2	60.0	0.0	0.0	29.7	90.9	0.4	18.2
Ｈ２９年		24.6	80.0	1.4	20.0	0.0	0.0	33.9	90.9	2.9	36.4
Ｈ２８年		30.6	100.0	0.8	20.0	0.0	0.0	36.3	90.9	0.7	36.4

*二十：二十世紀、赤：幸水、豊水等、ゴ：ゴールド二十世紀

*黒斑病の発病葉率及び発生ほ場率は二十世紀のみで算出し、ゴールド二十世紀は含めていない。

発生程度別基準　　（%）

	黒斑病	黒星病	赤星病	ハダニ類	うどんこ病
	発病葉率	発病葉率	発病葉率	寄生葉率	発病葉率
無	0	0	0	0	0
少	１～５	１～５	１～５	１～１５	１～５
中	６～１５	６～１５	６～１５	１６～３０	６～１５
多	１６～３０	１６～３０	１６～３０	３１～４５	１６～３０
甚	３１以上	３１以上	３１以上	４６以上	３１以上