

ナス

病害虫発生状況

- うどんこ病 ・ ・ 平年比やや少なかった。
- 褐色円星病 ・ ・ 平年比やや少なかった。
- すすかび病 ・ ・ 発生を認めなかった（平年並）。
- 灰色かび病 ・ ・ 発生を認めなかった（平年並）。
- 褐色腐敗病 ・ ・ 平年比やや多かった。
- アブラムシ類 ・ 発生を認めなかった（平年比やや少）。
- ハスモンヨトウ 平年比多かった。
- ハダニ類 ・ ・ ・ 平年並であった。虫種はカンザワハダニ。
- ハモグリバエ類 平年比少なかった。
- アザミウマ類 ・ 葉では平年並。花では例年比多かった。虫種はミカンキイロアザミウマ及びヒラズハナアザミウマ。
- コナジラミ類 ・ 平年比やや多かった。虫種はタバココナジラミ。
- その他の病害虫 一部のほ場でタバコガ類の被害を認めた。

発生程度別基準

	調査項目	無	少	中	多	甚
すすかび病	発病葉率(%)	0	1～25	26～50	51～75	76以上
灰色かび病	発病株率(%)	0	1～2	3～5	6～20	21以上
	発病果率(%)	0	1～5	6～10	11～20	21以上
アブラムシ類	1葉当たり寄生虫数	0	1～10	11～50	51～200	201以上
ハダニ類	寄生葉率(%)	0	1～10	11～30	31～50	51以上
アザミウマ類	寄生葉率(%)	0	1～10	11～30	31～50	51以上
	寄生花率(%)	0	1～25	26～50	51～75	76以上
コナジラミ類	1葉当たり寄生虫数	0	1～10	11～50	51～200	201以上
	成虫寄生葉率(%)	0	1～30	31～50	51～80	81以上

ナス巡回調査結果（２０株（５葉・５果・３花）調査）

調査日：令和７年１０月１４、１５日

調査場所		うどんこ病		褐色円星病		すすかび病		灰色かび病		褐色腐敗病	アブラムシ類		ハスモンヨトウ	ハダニ類		ハモグリバエ類		アザミウマ類				コナジラミ類	
		発病葉率(%)	発病株率(%)	発病葉率(%)	発病株率(%)	発病葉率(%)	発病株率(%)	発病果率(%)	発病株率(%)	発病果率(%)	寄生虫数(/葉)	寄生葉率(%)	幼虫数(/葉)	寄生虫数(/葉)	寄生葉率(%)	被害葉率(%)	被害株率(%)	寄生虫数(/葉)	寄生葉率(%)	寄生虫数(/花)	寄生花率(%)	成虫数(/葉)	寄生葉率(%)
京都市西京区 久御山町 ①		0.0	0.0	2.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.000	0.00	0.0	0.0	0.0	0.010	1.0	2.29	57.9	1.84	68.0
	②	61.0	75.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.000	0.00	0.0	0.0	0.0	0.030	2.0	0.16	13.2	1.98	40.0
	③	80.0	65.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.00	0.0	0.000	0.00	0.0	4.0	15.0	0.000	0.0	0.27	20.0	11.84	79.0
	④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.000	0.00	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.59	24.4	0.04	4.0
	⑤	1.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.000	0.00	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	1.61	61.1	0.20	14.0
	⑥	1.0	5.0	2.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.070	1.71	22.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.07	7.1	0.54	20.0
	⑦	0.0	0.0	1.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.000	0.00	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	1.54	25.0	0.14	12.0
	⑧																						
平 均	Ｒ７年	20.4	21.4	0.7	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.00	0.0	0.010	0.24	3.1	0.6	2.1	0.006	0.4	0.93	29.8	2.37	33.9
	平年比	並	やや少	少	少	並	並	並	並	やや多	やや少	やや少	多	並	並	やや少	少	並	並	多	多	やや多	やや多
	平 年	22.1	47.2	14.9	37.5	0.5	2.7	0.0	0.0	0.1	0.05	1.5	0.000	0.33	2.6	4.2	16.3	0.009	0.7	0.15	8.8	1.39	16.5
	Ｒ６年	26.0	37.5	5.8	25.8	0.5	1.7	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.000	0.00	0.0	0.0	5.0	0.000	0.0	0.14	10.4	11.03	77.8
	Ｒ５年	6.0	17.5	20.5	50.0	0.7	5.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.7	0.000	0.08	1.8	10.0	17.5	0.000	0.0	0.25	11.9	1.63	29.0
	Ｒ４年	5.2	21.7	21.7	44.2	2.5	14.2	0.0	0.0	0.0	0.08	2.7	0.003	1.38	5.7	6.5	23.3	0.000	0.0	0.13	9.4	0.18	10.7
	Ｒ３年	34.1	55.7	25.1	42.1	0.3	1.4	0.0	0.0	0.0	0.01	1.4	0.000	0.50	2.9	1.0	12.1	0.010	0.4	0.39	15.7	0.47	12.1
	Ｒ２年	14.7	47.9	18.3	47.1	0.1	2.9	0.0	0.0	0.0	0.17	3.6	0.000	0.29	6.0	7.1	25.7	0.026	1.9	0.03	4.2	0.26	11.1
	Ｒ元年	40.6	77.1	3.1	24.3	0.6	2.1	0.0	0.0	0.0	0.04	1.4	0.000	0.95	7.9	1.1	6.4	0.006	0.6	0.21	5.9	0.02	3.9
	Ｈ３０年	44.3	82.5	24.8	47.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.08	2.3	0.000	0.00	0.0	2.0	13.8	0.023	2.0	0.02	1.7	0.16	8.3
	Ｈ２９年	26.6	51.4	7.4	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.06	1.9	0.000	0.01	0.3	6.1	20.0	0.020	1.0	0.18	14.7	0.04	3.0
	Ｈ２８年	17.1	50.7	12.7	47.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.01	0.9	0.000	0.00	0.0	3.9	17.9	0.001	0.1	0.08	5.8	0.05	4.6
	Ｈ２７年	6.6	30.0	9.1	32.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.000	0.11	1.1	4.6	21.4	0.010	0.6	0.08	8.0	0.06	4.6
発 生 ほ場率 (%)	Ｒ７年	57.1		71.4		0.0		0.0		14.3	0.0		14.3	14.3		14.3		28.6		100.0		100.0	
	平年（例年）比	やや少		並		並		並		やや多	やや少		多	やや少		少		並		(並)		並	
	平 年（例年）	75.0		72.5		14.0		0.0		6.8	33.6		1.7	26.4		64.5		27.5		(77.4)		78.7	
	Ｒ６年	50.0		83.3		16.7		0.0		0.0	0.0		0.0	16.7		50.0		0.0		83.3		100.0	
	Ｒ５年	50.0		66.7		33.3		0.0		0.0	50.0		0.0	16.7		50.0		0.0		100.0		100.0	
	Ｒ４年	50.0		100.0		33.3		0.0		0.0	50.0		16.7	16.7		66.7		0.0		100.0		83.3	
	Ｒ３年	85.7		71.4		14.3		0.0		0.0	14.3		0.0	28.6		57.1		14.3		71.4		71.4	
	Ｒ２年	85.7		85.7		28.6		0.0		0.0	42.9		0.0	57.1		71.4		57.1		57.1		100.0	
	Ｒ元年	100.0		57.1		14.3		0.0		0.0	42.9		0.0	57.1		57.1		28.6		57.1		71.4	
	Ｈ３０年	100.0		75.0		0.0		0.0		25.0	50.0		0.0	0.0		50.0		75.0		50.0		75.0	
	Ｈ２９年	71.4		57.1		0.0		0.0		0.0	42.9		0.0	28.6		71.4		28.6		100.0		28.6	
	Ｈ２８年	85.7		71.4		0.0		0.0		42.9	42.9		0.0	0.0		100.0		14.3		—		85.7	
	Ｈ２７年	71.4		57.1		0.0		0.0		0.0	0.0		0.0	42.9		71.4		57.1		—		100.0	