

ネギ

病害虫発生状況

- | | | |
|----|-----------|--|
| 1 | さび病 | 「小株」：発生を認めなかった（平年並）。
「大株」：発生を認めなかった（平年並）。 |
| 2 | 黒斑病 | 「小株」：平年比多かった。
「大株」：平年比やや多かった。 |
| 3 | べと病 | 「大株」：発生を認めなかった（平年並）。 |
| 4 | えそ条斑病 | 「小株」：発生を認めなかった（平年並）。
「大株」：平年比やや少なかった。 |
| 5 | アブラムシ類 | 「小株」：発生を認めなかった（平年並）。 |
| 6 | シロイチモジヨトウ | 「小株」：平年比多かった。
「大株」：例年並であった。 |
| 7 | ハスモンヨトウ | 「大株」：発生を認めなかった（平年並）。 |
| 8 | ネギハモグリバエ | 「小株」：平年並であった。
「大株」：平年並であった。 |
| 9 | ネギアザミウマ | 「小株」：平年比やや少なかった。
「大株」：平年並であった。 |
| 10 | その他の病害虫 | 発生を認めなかった。 |

小株ネギ(葉長40cm未満) 調査結果 (25株調査)

調査日：令和7年8月13、14、15日

調査場所	さび病		黒斑病		えそ条斑病		アブラムシ類		シロイチモジヨトウ		ネギハモグリバエ		ネギアザミウマ		葉長 (cm)
	発病株率 (%)		発病株率 (%)		発病株率 (%)	発病度	虫数 (/株)	寄生株率 (%)	幼虫数 (/株)	寄生株率 (%)	被害株率 (%)	被害度	被害株率 (%)	被害度	
京都市西京区	0.0		0.0		0.0	0.0	0.00	0.0	0.120	12.0	72.0	20.0	48.0	14.0	38.0
京都市伏見区①	0.0		0.0		0.0	0.0	0.00	0.0	0.080	8.0	0.0	0.0	28.0	7.0	34.0
〃 ②	0.0		0.0		0.0	0.0	0.00	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	16.0	4.0	24.0
〃 ③	0.0		16.0		0.0	0.0	0.00	0.0	1.120	60.0	0.0	0.0	76.0	19.0	39.0
八幡市①	0.0		0.0		0.0	0.0	0.00	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0
〃 ②	0.0		0.0		0.0	0.0	0.00	0.0	0.120	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.0
平 均	R7年	0.0	2.7	0.0	0.0	0.00	0.0	0.240	14.7	12.0	3.3	28.0	7.3	30.5	
	平年比	並	多	並	並	並	並	多	多	やや多	やや多	やや少	やや少		
	平年	0.0	0.1	2.7	0.7	0.00	0.0	0.036	1.8	6.7	1.7	44.8	11.3	30.7	
	R6年	0.0	0.0	0.8	0.2	0.00	0.0	0.032	1.6	2.4	0.6	32.8	8.2	34.0	
	R5年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.000	0.0	4.5	1.1	36.5	9.1	33.5	
	R4年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.000	0.0	1.3	0.3	38.7	9.7	31.5	
	R3年	0.0	0.7	8.7	2.2	0.00	0.0	0.013	1.3	0.0	0.0	33.3	8.3	35.3	
	R2年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.110	2.0	9.5	2.4	49.0	12.3	32.1	
	R元年	0.0	0.0	2.0	0.5	0.00	0.0	0.080	2.6	3.2	0.8	50.4	12.6	33.6	
	H30年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.125	4.0	4.0	1.0	47.0	11.8	25.5	
	H29年	0.0	0.0	7.0	1.8	0.00	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	86.0	22.3	28.5	
	H28年	0.0	0.0	5.0	1.3	0.00	0.0	0.000	6.0	18.0	4.5	66.0	16.5	27.5	
	H27年	0.0	0.0	3.2	0.8	0.00	0.0	0.000	0.0	24.0	6.0	8.0	2.0	25.4	
発 生 ほ場率	R7年	0.0	16.7	0.0		0.0	0.0	66.7		16.7		66.7			
	平年比	並	多	並		並		多		やや少		少			
	平年	0.0	1.7	28.3		0.0		22.6		36.2		87.4			
	R6年	0.0	0.0	20.0		0.0		20.0		20.0		80.0			
	R5年	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0		25.0		87.5			
	R4年	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0		16.7		83.3			
	R3年	0.0	16.7	33.3		0.0		33.3		0.0		83.3			
	R2年	0.0	0.0	0.0		0.0		37.5		50.0		100.0			
	R元年	0.0	0.0	60.0		0.0		60.0		60.0		80.0			
	H30年	0.0	0.0	0.0		0.0		50.0		50.0		100.0			
	H29年	0.0	0.0	75.0		0.0		0.0		0.0		100.0			
	H28年	0.0	0.0	75.0		0.0		25.0		100.0		100.0			
	H27年	0.0	0.0	20.0		0.0		0.0		40.0		60.0			

大株ネギ(葉長40cm以上) 調査結果 (25株調査)

調査日：令和7年8月13、14、15日

調査場所	さび病		黒斑病		べと病		えそ条斑病		シロイチモジヨトウ			ハスモンヨトウ		ネギハモグリバエ		ネギアザミウマ		葉長 (cm)
	発病株率 (%)	発病株率 (%)	発病株率 (%)	発病株率 (%)	発病度	幼虫数 (/株)	寄生株率 (%)	被害株率 (%)	寄生株率 (%)	被害株率 (%)	被害株率 (%)	被害度	被害株率 (%)	被害度				
京都市西京区①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.080	8.0	16.0	0.0	0.0	32.0	8.0	100.0	25.0	40.0			
〃 ②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	36.0	49.0			
京都市伏見区①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	15.0	78.0			
〃 ②	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.0	42.0	60.0			
〃 ③	0.0	12.0	0.0	4.0	1.0	0.040	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.0	17.0	72.5			
八幡市岩田	0.0	0.0	0.0	4.0	1.0	0.000	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	5.0	46.0			
平 均	R 7 年	0.0	4.0	0.0	1.3	0.3	0.020	2.0	4.7	0.0	0.0	5.3	1.3	74.0	23.3	57.6		
	平年(例年)比	並	やや多	並	やや少	やや少	(並)	(並)	(並)	並	並	やや多	やや多	並	並			
	平年(例年)	1.2	6.1	2.7	21.3	5.3	(0.062)	(2.0)	(3.9)	0.0	0.0	7.7	1.9	71.9	19.7	54.0		
	R 6 年	0.0	0.0	0.0	1.0	0.3	0.330	6.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.0	9.3	46.8		
	R 5 年	0.0	0.0	0.7	6.7	1.7	0.073	3.3	6.0	0.0	0.0	2.0	0.5	54.0	13.5	50.0		
	R 4 年	0.0	4.0	0.0	15.4	3.9	0.046	3.4	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	49.7	12.4	49.7		
	R 3 年	0.0	0.0	6.3	8.0	2.0	0.034	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	54.3	13.6	53.7		
	R 2 年	0.0	0.0	0.0	12.7	3.2	0.000	0.0	1.3	0.0	0.0	0.7	0.2	77.3	19.3	55.3		
	R 元年	0.0	0.0	0.0	25.1	6.3	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.1	16.3	60.0		
	H 3 0 年	0.0	0.0	0.0	39.2	9.8	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	1.6	100.0	25.0	52.3		
	H 2 9 年	0.0	2.3	0.0	45.1	11.3	0.010	0.6	—	0.0	0.0	2.9	0.7	98.3	32.7	58.1		
	H 2 8 年	10.7	5.3	20.0	60.0	15.0	—	—	—	0.0	0.0	20.0	5.0	98.3	33.7	56.3		
	H 2 7 年	1.3	49.3	0.0	0.0	0.0	—	—	—	0.0	0.0	45.3	11.3	85.3	21.3	58.3		
発 生 ほ場率	R 7 年	0.0	33.3	0.0	33.3		33.3		50.0		0.0		16.7		100.0			
	平年(例年)比	並	やや多	並	やや少		(並)		(並)		並		並					
	平年(例年)	10.0	21.0	7.4	70.1		(22.9)		(36.9)		0.0		33.3		98.3			
	R 6 年	0.0	0.0	0.0	25.0		50.0		75.0		0.0		0.0		100.0			
	R 5 年	0.0	0.0	16.7	66.7		33.3		50.0		0.0		16.7		83.3			
	R 4 年	0.0	28.6	0.0	71.4		57.1		71.4		0.0		0.0		100.0			
	R 3 年	0.0	0.0	28.6	83.3		28.6		28.6		0.0		0.0		100.0			
	R 2 年	0.0	0.0	0.0	83.3		0.0		33.3		0.0		33.3		100.0			
	R 元年	0.0	0.0	0.0	71.4		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0			
	H 3 0 年	0.0	0.0	0.0	100.0		0.0		0.0		0.0		40.0		100.0			
	H 2 9 年	0.0	14.3	28.6	100.0		14.3		—		0.0		42.9		100.0			
	H 2 8 年	66.7	66.7	0.0	100.0		—		—		0.0		100.0		100.0			
	H 2 7 年	33.3	100.0	0.0	0.0		—		—		0.0		100.0		100.0			

(程度別基準)

	調査項目	無	少	中	多	甚
さび病	発病株率	0	～2.0	～4.0	～6.0	～10.0
アブラムシ類	寄生株率	0	～2.5	～5.0	～7.5	～10.0
ネギハモグリバエ	被害葉率(程度)	0	～2.5	～5.0	～7.5	～10.0
ネギアザミウマ	被害葉率(程度)	0	～2.5	～5.0	～7.5	～10.0

※ ハモグリバエ、アザミウマの被害度＝(4A+3B+2C+D)÷(25×4)×100

- A：1株被害葉率
B：1株被害葉率
C：1株被害葉率
D：1株被害葉率

ネギえそ条斑病 発病程度別調査基準

- 発病程度A：全葉面積の31%以上に病斑が認められる。
発病程度B：全葉面積の21～30%に病斑が認められる。
発病程度C：全葉面積の11～20%に病斑が認められる。
発病程度D：全葉面積の1～10%に病斑が認められる。
発病程度E：病斑の発生が認められない。

$$\text{発病度} = \frac{4A + 3B + 2C + D}{4 \times \text{調査株数}} \times 100$$