

ネギ

病害虫発生状況

- さび病・・・・・・・・・「小株」：発生を認めなかった（平年並）。 「大株」：発生を認めなかった（平年並）。
- 黒斑病・・・・・・・・・「小株」：発生を認めなかった（平年並）。 「大株」：平年比多かった。
- べと病・・・・・・・・・「小株」：発生を認めなかった（平年並）。 「大株」：発生を認めなかった（平年並）。
- えそ条斑病・・・・・・・・・「小株」：平年比やや多かった。 「大株」：平年比やや少なかった。
- アブラムシ類・・・・・・・・・「小株」：発生を認めなかった（平年並）。 「大株」：発生を認めなかった（平年並）。
- シロイチモジヨトウ・・・・・・・・・「小株」：平年比多かった。 「大株」：伏見区①の調査外で発生を認め、例年比やや多かった。
- ハスモンヨトウ・・・・・・・・・「小株」：発生を認めなかった（平年並）。 「大株」：発生を認めなかった（平年並）。
- ネギハモグリバエ・・・・・・・・・「小株」：平年比やや少なかった。 「大株」：平年並であった。
- ネギアザミウマ・・・・・・・・・「小株」：平年比やや多かった。 「大株」：平年比やや多かった。
- その他の病害虫・・・・・・・・・発生を認めなかった。

小株ネギ(葉長40cm未満)調査結果(25株調査)

調査日：令和8年8月13、14、17日

調査場所	さび病	黒斑病	えそ条斑病		アブラムシ類		シロイチモジヨトウ		ネギハモグリバエ		ネギアザミウマ		葉長 (cm)	
	発病株率 (%)	発病株率 (%)	発病株率 (%)	発病度	虫数 (／株)	寄生株率 (%)	幼虫数 (／株)	寄生株率 (%)	被害株率 (%)	被害度	被害株率 (%)	被害度		
京都市西京区	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.040	4.0	4.0	1.0	32.0	8.0	33.0	
京都市伏見区 ①	0.0	0.0	4.0	1.0	0.00	0.0	0.400	8.0	0.0	0.0	96.0	29.0	38.0	
〃 ②	0.0	0.0	32.0	8.0	0.00	0.0	1.800	44.0	0.0	0.0	100.0	39.0	39.0	
八幡市 ①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	24.0	6.0	23.0	
〃 ②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	12.0	3.0	22.0	
平 均	R 8 年	0.0	0.0	7.2	1.8	0.00	0.0	0.448	11.2	0.8	0.2	52.8	17.0	31.0
	平年比	並	並	やや多	やや多	並	並	多	多	やや少	やや少	やや多	やや多	
	平 年	0.0	0.3	2.3	0.6	0.00	0.0	0.060	3.2	5.5	1.4	46.8	11.8	31.2
	R 7 年	0.0	2.7	0.0	0.0	0.00	0.0	0.240	14.7	12.0	3.3	28.0	7.3	30.5
	R 6 年	0.0	0.0	0.8	0.2	0.00	0.0	0.032	1.6	2.4	0.6	32.8	8.2	34.0
	R 5 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.000	0.0	4.5	1.1	36.5	9.1	33.5
	R 4 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.000	0.0	1.3	0.3	38.7	9.7	31.5
	R 3 年	0.0	0.7	8.7	2.2	0.00	0.0	0.013	1.3	0.0	0.0	33.3	8.3	35.3
	R 2 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.110	2.0	9.5	2.4	49.0	12.3	32.1
	R 元年	0.0	0.0	2.0	0.5	0.00	0.0	0.080	2.6	3.2	0.8	50.4	12.6	33.6
	H 3 0 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.125	4.0	4.0	1.0	47.0	11.8	25.5
	H 2 9 年	0.0	0.0	7.0	1.8	0.00	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	86.0	22.3	28.5
	H 2 8 年	0.0	0.0	5.0	1.3	0.00	0.0	0.000	6.0	18.0	4.5	66.0	16.5	27.5
発 生 ほ場率	R 8 年	0.0	0.0	40.0		0.0		60.0		20.0		100.0		
	平年比	並	並	並		並		やや多		並		並		
	平 年	0.0	3.3	26.3		0.0		29.3		33.8		88.1		
	R 7 年	0.0	16.7	0.0		0.0		66.7		16.7		66.7		
	R 6 年	0.0	0.0	20.0		0.0		20.0		20.0		80.0		
	R 5 年	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0		25.0		87.5		
	R 4 年	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0		16.7		83.3		
	R 3 年	0.0	16.7	33.3		0.0		33.3		0.0		83.3		
	R 2 年	0.0	0.0	0.0		0.0		37.5		50.0		100.0		
	R 元年	0.0	0.0	60.0		0.0		60.0		60.0		80.0		
	H 3 0 年	0.0	0.0	0.0		0.0		50.0		50.0		100.0		
	H 2 9 年	0.0	0.0	75.0		0.0		0.0		0.0		100.0		
	H 2 8 年	0.0	0.0	75.0		0.0		25.0		100.0		100.0		

大株ネギ(葉長40cm以上)調査結果(25株調査)

調査日：令和8年8月13、14、17日

調査場所		さび病	黒斑病	べと病	えそ条斑病		シロイチモジヨトウ			ハスモンヨトウ		ネギハモグリバエ		ネギアザミウマ		葉長 (cm)
		発病株率 (%)	発病株率 (%)	発病株率 (%)	発病株率 (%)	発病度	幼虫数 (／株)	寄生株率 (%)	被害株率 (%)	寄生株率 (%)	被害株率 (%)	被害株率 (%)	被害度	被害株率 (%)	被害度	
京都市南区		0.0	28.0	0.0	4.0	1.0	0.000	0.0	8.0	0.0	0.0	4.0	1.0	100.0	65.0	42.0
京都市伏見区 ①		0.0	4.0	0.0	8.0	2.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.0	24.0	63.0
〃 ②		0.0	0.0	0.0	4.0	1.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.0	22.0	63.0
八幡市		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.120	12.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.0	9.0	43.0
平 均	R 8 年	0.0	8.0	0.0	4.0	1.0	0.030	3.0	5.0	0.0	0.0	1.0	0.3	80.0	30.0	52.8
	平年(例年)比	並	多	並	やや少	やや少	(並)	(やや多)	(並)	並	並	並	並	並	やや多	
	平年(例年)	1.1	1.6	2.7	21.5	5.4	(0.057)	(2.0)	(4.0)	0.0	0.0	3.7	0.9	70.8	19.9	54.0
	R 7 年	0.0	4.0	0.0	1.3	0.3	0.020	2.0	4.7	0.0	0.0	5.3	1.3	74.0	23.3	57.6
	R 6 年	0.0	0.0	0.0	1.0	0.3	0.330	6.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.0	9.3	46.8
	R 5 年	0.0	0.0	0.7	6.7	1.7	0.073	3.3	6.0	0.0	0.0	2.0	0.5	54.0	13.5	50.0
	R 4 年	0.0	4.0	0.0	15.4	3.9	0.046	3.4	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	49.7	12.4	49.7
	R 3 年	0.0	0.0	6.3	8.0	2.0	0.034	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	54.3	13.6	53.7
	R 2 年	0.0	0.0	0.0	12.7	3.2	0.000	0.0	1.3	0.0	0.0	0.7	0.2	77.3	19.3	55.3
	R元年	0.0	0.0	0.0	25.1	6.3	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.1	16.3	60.0
	H 3 0 年	0.0	0.0	0.0	39.2	9.8	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	1.6	100.0	25.0	52.3
	H 2 9 年	0.0	2.3	0.0	45.1	11.3	0.010	0.6	—	0.0	0.0	2.9	0.7	98.3	32.7	58.1
	H 2 8 年	10.7	5.3	20.0	60.0	15.0	—	—	—	0.0	0.0	20.0	5.0	98.3	33.7	56.3
発 生 ほ場率	R 8 年	0.0	50.0	0.0	75.0		50.0		75.0	0.0		25.0		100.0		57.6
	平年(例年)比	並	多	並	並		(やや多)		(多)	並		並		並		
	平年(例年)	6.7	14.3	7.4	73.4		(24.1)		(38.5)	0.0		25.0		98.3		
	R 7 年	0.0	33.3	0.0	33.3		33.3		50.0	0.0		16.7		100.0		
	R 6 年	0.0	0.0	0.0	25.0		50.0		75.0	0.0		0.0		100.0		
	R 5 年	0.0	0.0	16.7	66.7		33.3		50.0	0.0		16.7		83.3		
	R 4 年	0.0	28.6	0.0	71.4		57.1		71.4	0.0		0.0		100.0		
	R 3 年	0.0	0.0	28.6	83.3		28.6		28.6	0.0		0.0		100.0		
	R 2 年	0.0	0.0	0.0	83.3		0.0		33.3	0.0		33.3		100.0		
	R元年	0.0	0.0	0.0	71.4		0.0		0.0	0.0		0.0		100.0		
	H 3 0 年	0.0	0.0	0.0	100.0		0.0		0.0	0.0		40.0		100.0		
	H 2 9 年	0.0	14.3	28.6	100.0		14.3		—	0.0		42.9		100.0		
	H 2 8 年	66.7	66.7	0.0	100.0		—		—	0.0		100.0		100.0		

(程度別基準)

調査項目	無	少	中	多	甚
さび病 発病株率	0	～20	～40	～60	～100
アブラムシ類 寄生株率	0	～25	～50	～75	～100
ネギハモグリバエ 被害率率(程度)	0	～25	～50	～75	～100
ネギアザミウマ 被害率率(程度)	0	～25	～50	～75	～100

※ ハモグリバエ、アザミウマの被害度 = (4A + 3B + 2C + D) / (25 × 4) × 100

- A：1株被害率率 ～100%
- B：1株被害率率 ～50%
- C：1株被害率率 ～30%
- D：1株被害率率 ～10%

ネギえそ条斑病 発病程度別調査基準

発病程度A：全葉面積の31%以上に病斑が認められる。
 発病程度B：全葉面積の21～30%に病斑が認められる。
 発病程度C：全葉面積の11～20%に病斑が認められる。
 発病程度D：全葉面積の1～10%に病斑が認められる。
 発病程度E：病斑の発生が認められない。

$$\text{発病度} = \frac{4A + 3B + 2C + D}{4 \times \text{調査株数}} \times 100$$