ネ　ギ

病害虫発生状況

1	さび病 ・・・・・・・・	「小株」：発生を認めなかった（平年並）。	「大株」：発生を認めなかった（平年並）。
2	黒斑病 ・・・・・・・・	「小株」：発生を認めなかった（平年並）。	「大株」：発生を認めなかった（平年並）。
3	べと病 ・・・・・・・・		「大株」：発生を認めなかった（平年並）。
4	えそ条斑病 ・・・・・・	「小株」：平年比多かった。	「大株」：平年比多かった。
5	アブラムシ類 ・・・・・	「小株」：発生を認めなかった（平年並）。	
6	シロイチモジヨトウ ・・	「小株」：平年比やや多かった。	「大株」：例年比やや多かった。
7	ハスモンヨトウ ・・・・・・・・		「大株」：発生を認めなかった（平年並）。
8	ネギハモグリバエ ・・・	「小株」：平年比やや少なかった。	「大株」：平年比やや少なかった。
9	ネギアザミウマ ・・・・	「小株」：平年比やや多かった。	「大株」：平年比やや多かった。
10	その他の病害虫 ・・・・	「小株」：発生を認めなかった。	「大株」：発生を認めなかった。

小株ネギ(葉長４０ｃｍ未満）調査結果（２５株調査）　　調査日：令和８年１０月１３、１４日

調査場所		さび病	黒斑病	えそ条斑病		アブラムシ類		シロイチモジヨトウ		ネギハモグリバエ		ネギアザミウマ		葉長
		発病株率（%）	発病株率（%）	発病株率（%）	発病度	虫数（／株）	寄生株率（%）	幼虫数（／株）	寄生株率（%）	被害株率（%）	被害度	被害株率（%）	被害度	（cm）
京都市西京区		0.0	0.0	8.0	2.0	0.000	0.0	0.04	4.0	20.0	4.0	100.0	66.0	29.0
京都市伏見区 ①		0.0	0.0	8.0	2.0	0.000	0.0	0.04	4.0	0.0	0.0	100.0	75.0	30.0
〃 ②		0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.04	4.0	0.0	0.0	100.0	56.0	29.0
八幡市		0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	68.0	17.0	31.0
平　均	Ｒ８年	0.0	0.0	4.0	1.0	0.000	0.0	0.03	3.0	5.0	1.0	92.0	53.5	29.8
	平年比	並	並	多	多	並	並	並	並	やや少	やや少	多	多	－
	平年	0.0	0.0	0.2	0.1	0.004	0.4	0.06	3.3	22.7	5.9	42.9	11.0	31.3
	Ｒ７年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.26	10.4	23.2	5.8	59.2	17.2	33.6
	Ｒ６年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007	0.7	0.01	0.7	0.0	0.0	12.7	3.2	29.2
	Ｒ５年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.01	0.6	0.6	0.1	53.1	13.9	32.6
	Ｒ４年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.14	5.5	20.0	6.4	21.5	5.4	32.5
	Ｒ３年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.01	1.1	14.9	5.6	62.9	15.9	29.9
	Ｒ２年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.03	2.4	6.4	1.6	18.4	4.6	35.4
	Ｒ元年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016	1.6	0.00	0.0	38.4	8.6	58.4	14.6	26.4
	Ｈ３０年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016	1.6	0.00	0.0	49.6	12.4	33.6	8.4	28.0
	Ｈ２９年	0.0	0.0	0.8	0.2	0.000	0.0	0.00	0.0	31.2	7.8	70.4	17.6	32.2
	Ｈ２８年	0.0	0.0	1.6	0.4	0.000	0.0	0.10	12.0	42.4	10.6	39.2	9.8	33.7
発　生 ほ場率	Ｒ８年	0.0	0.0	50.0		0.0		75.0		25.0		100.0		
	平年比	並	並	多		並		多		やや少		並		
	平年	0.0	0.0	4.0		7.7		19.0		48.8		81.7		
	Ｒ７年	0.0	0.0	0.0		0.0		60.0		40.0		80.0		
	Ｒ６年	0.0	0.0	0.0		16.7		16.7		0.0		66.7		
	Ｒ５年	0.0	0.0	0.0		0.0		14.3		14.3		85.7		
	Ｒ４年	0.0	0.0	0.0		0.0		25.0		25.0		25.0		
	Ｒ３年	0.0	0.0	0.0		0.0		14.3		28.6		100.0		
	Ｒ２年	0.0	0.0	0.0		0.0		20.0		40.0		80.0		
	Ｒ元年	0.0	0.0	0.0		20.0		0.0		60.0		80.0		
	Ｈ３０年	0.0	0.0	20.0		40.0		0.0		100.0		100.0		
	Ｈ２９年	0.0	0.0	20.0		0.0		0.0		80.0		100.0		
	Ｈ２８年	0.0	0.0	0.0		0.0		40.0		100.0		100.0		

大株ネギ(葉長４０ｃｍ以上)調査結果（２５株調査）　　調査日：令和８年１０月１３、１４日

調査場所		さび病	黒斑病	べと病	えそ条斑病		シロイチモジヨトウ			ハスモンヨトウ		ネギハモグリバエ		ネギアザミウマ		葉長
		発病株率（%）	発病株率（%）	発病株率（%）	発病株率（%）	発病度	幼虫数（／株）	寄生株率（%）	被害株率（%）	寄生株率（%）	被害株率（%）	被害株率（%）	被害度	被害株率（%）	被害度	（cm）
京都市南区		0.0	0.0	0.0	16.0	4.0	0.08	8.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	7.0	64.0
京都市伏見区 ①		0.0	0.0	0.0	8.0	2.0	0.00	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	71.0	47.0
〃 ②		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	64.0	46.0
八幡市		0.0	0.0	0.0	8.0	2.0	0.04	4.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.0	23.0	53.0
平　均	Ｒ８年	0.0	0.0	0.0	8.0	2.0	0.03	3.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	41.3	52.5
	平年(例年)比	並	並	並	多	多	（並）	（やや多）	（やや多）	並	並	少	少	やや多	多	－
	平年(例年)	0.0	0.2	0.0	0.9	0.2	(0.08)	(2.8)	(10.2)	0.1	0.1	23.4	6.6	49.7	13.1	49.8
	Ｒ７年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.39	4.0	14.3	0.0	0.0	6.3	1.6	73.1	23.6	54.7
	Ｒ６年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.10	5.6	24.8	0.0	0.0	1.6	0.4	30.4	7.6	45.6
	Ｒ５年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.6	0.0	0.0	10.3	2.6	62.9	15.7	55.7
	Ｒ４年	0.0	0.0	0.0	0.6	0.1	0.01	1.1	11.4	0.0	0.0	14.9	3.9	20.0	5.0	48.4
	Ｒ３年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.08	2.9	2.9	0.0	0.0	11.4	4.9	54.9	14.6	49.4
	Ｒ２年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.11	9.1	26.9	0.0	0.0	8.6	2.1	17.7	4.4	44.9
	Ｒ元年	0.0	2.0	0.0	3.3	0.8	0.01	0.8	4.0	0.0	0.0	39.2	9.8	48.8	12.6	47.2
	Ｈ３０年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.8	4.0	0.0	0.0	39.2	9.8	48.8	12.6	47.2
	Ｈ２９年	0.0	0.0	0.0	3.0	0.8	0.0	1.0	3.0	0.0	0.0	46.0	16.5	100.0	25.0	50.1
	Ｈ２８年	0.0	0.0	0.0	2.0	0.5	－	－	－	1.0	1.0	57.0	14.5	40.0	10.0	54.5
発　生 ほ場率	Ｒ８年	0.0	0.0	0.0	75.0		57.1		57.1	0.0		42.9		100.0		
	平年(例年)比	並	並	並	多		（やや多）		（並）	並		並		並		
	平年(例年)	0.0	1.7	0.0	15.6		(35.4)		(57.2)	2.5		58.9		86.9		
	Ｒ７年	0.0	0.0	0.0	0.0		57.1		57.1	0.0		42.9		100.0		
	Ｒ６年	0.0	0.0	0.0	0.0		40.0		100.0	0.0		40.0		60.0		
	Ｒ５年	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		14.3	0.0		28.6		100.0		
	Ｒ４年	0.0	0.0	0.0	14.3		14.3		71.4	0.0		28.6		71.4		
	Ｒ３年	0.0	0.0	0.0	0.0		42.9		42.9	0.0		14.3		85.7		
	Ｒ２年	0.0	0.0	0.0	0.0		85.7		85.7	0.0		71.4		71.4		
	Ｒ元年	0.0	16.7	0.0	66.7		33.3		33.3	0.0		83.3		100.0		
	Ｈ３０年	0.0	0.0	0.0	0.0		20.0		60.0	0.0		80.0		80.0		
	Ｈ２９年	0.0	0.0	0.0	50.0		25.0		50.0	0.0		100.0		100.0		
	Ｈ２８年	0.0	0.0	0.0	25.0		－		－	25.0		100.0		100.0		

（程度別基準）

	調査項目	無	少	中	多	甚
さび病	発病株率	0	～２０	～４０	～６０	～１００
アブラムシ類	寄生株率	0	～２５	～５０	～７５	～１００
ネギハモグリバエ	被害葉率（程度）	0	～２５	～５０	～７５	～１００
ネギアザミウマ	被害葉率（程度）	0	～２５	～５０	～７５	～１００

※　ハモグリバエ、アザミウマの被害度＝（４Ａ＋３Ｂ＋２Ｃ＋Ｄ）／（２５×４）×１００
Ａ：１株被害葉率　～１００%
Ｂ：１株被害葉率　～５０%
Ｃ：１株被害葉率　～３０%
Ｄ：１株被害葉率　～１０%

ネギえそ条斑病　発病程度別調査基準

発病程度Ａ：全葉面積の31%以上に病斑が認められる。
発病程度Ｂ：全葉面積の21～30%に病斑が認められる。
発病程度Ｃ：全葉面積の11～20%に病斑が認められる。
発病程度Ｄ：全葉面積の1～10%に病斑が認められる。
発病程度Ｅ：病斑の発生が認められない。

$$\text{発病度} = \frac{4A + 3B + 2C + D}{4 \times \text{調査株数}} \times 100$$