韓国で口蹄疫の発生が続いています！

今一度、発生予防を徹底しましょう！

韓国北西部の京畿道において、本年3例目となる口蹄疫が発生しました。人や物の移動が増えており、我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況ですので、発生予防対策の徹底をお願いします。

出典：韓国農林畜産食品部、WOAH

2026年３月２日時点
農林水産省動物衛生課

	発生日	場所		動物種	飼養頭数
1	’25/3/13	全南	霊岩郡	牛	184
2	’25/3/14	全南	霊岩郡	牛	15
3*	’25/3/14	全南	霊岩郡	牛	471
4	’25/3/14	全南	霊岩郡	牛	31
5	’25/3/15	全南	務安郡	牛	88
6	’25/3/17	全南	霊岩郡	牛	365
7	’25/3/17	全南	霊岩郡	牛	25
8	’25/3/17	全南	霊岩郡	牛	100
9	’25/3/18	全南	霊岩郡	牛	49
10	’25/3/18	全南	霊岩郡	牛	25
11	’25/3/19	全南	霊岩郡	牛	125
12	’25/3/19	全南	霊岩郡	牛	835
13	’25/3/20	全南	霊岩郡	牛	43
14	’25/3/23	全南	霊岩郡	牛	31
15	‘25/4/10	全南	務安郡	豚	5,223
16	‘25/4/10	全南	務安郡	豚	1,736
17	‘25/4/12	全南	務安郡	豚	1,951
18	‘25/4/12	全南	務安郡	豚	1,931
19	‘25/4/13	全南	務安郡	豚	3,216
20	‘26/1/30	仁川	江華郡	牛	246
21	‘26/2/20	京畿	高陽市	牛	133
22	‘26/2/28	京畿	高陽市	牛	168

*関連農場２農場（いずれも検査陽性）あり。



仁川広域市（１件）
2026年１月30日
江華郡　牛：**1件（O型）**

京畿道（２件）
2026年２月20日
高陽市　牛：**1件（O型）**
2026年２月28日（※確認中）
高陽市　牛：**1件**（※血清型確認中）

全羅南道（**19件**）
2025年3月13日（確定日は14日）
霊岩郡　牛：**1件（O型）**
2025年3月14日（確定日は15日）
霊岩郡　牛：**3件（O型）**
2025年3月15日　（確定日は16日）
務安郡　牛：**1件（O型）**
2025年3月17日
霊岩郡　牛：**3件（O型）**
2025年3月18日
霊岩郡　牛：**2件（O型）**
2025年3月19日
霊岩郡　牛：**2件（O型）**
2025年3月20日
霊岩郡　牛：**1件（O型）**
2025年3月23日
霊岩郡　牛：**1件（O型）**
2025年４月10日
務安郡　豚：**2件（O型）**
2025年４月12日
務安郡　豚：**2件（O型）**
2025年４月13日
務安郡　豚：**1件（O型）**

注：日付はWOAH報告の発生日
頭数は当該農場で飼養されている感受性動物数

牛農家の皆様　発生予防対策の徹底をお願いします！

- □ 農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外の立入を制限**しましょう。
- □ 農場の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用**し、**手指を消毒**するとともに、持ち込む**物品**や**出入りする車両の消毒を徹底**しましょう。
- □ 畜舎の出入口に**専用の靴の着用や踏込消毒槽等を設置**することにより、出入りする人の**靴底の消毒を徹底**しましょう。
- □ 従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控える**とともに、**これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないようにしましょう。**
- □ **毎日、飼養家畜の健康観察**を行い、**疑わしい症状があれば直ぐに通報**しましょう。

裏面もチェック！



専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- 衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施**しましょう。
- 畜舎ごとに**専用の靴または踏込消毒を設置**し、使用しましょう。

専用の服や靴の使用、手指消毒

◎効果的な消毒のポイント

- 踏込消毒槽の消毒液は、汚れで効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。また、**消毒薬が汚れて**いたら、**直ちに交換**しましょう。
- 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤのみを消毒するのではなく、**泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合は**農場専用のフロアマット**等の使用や**車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。

※推奨される消毒薬の例：グルタルアルデヒド、ハロゲン（塩素等）、クエン酸、アルカリ（石灰）等

推奨される踏込消毒槽の設置方法

②消毒液の槽

⇧

①水洗の槽

汚れをしっかり落としてから消毒

車両はタイヤだけでなく、**泥よけの内側**まで消毒し、**フロアマットの交換**や**ペダル等車内も消毒**

≪要注意≫

★ **逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適**です！

★ 消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性**の消毒薬を**同時に使用しない**こと！

疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

～牛の症状～

写真：宮崎県提供

＜A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果＞

写真：動物衛生研究部門提供

上顎口唇潰瘍

水疱が破れている

毎日必ず健康観察し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や**家畜保健衛生所**に**連絡**してください。

牛では、１頭のみに着目せず、泡状のよだれを多く流している個体が多い、上記の症状が急速に拡がるなど、**群としての異状の有無を確認することが重要**です。

京都府中丹家畜保健衛生所　**※異状が見られたら、すぐに連絡して下さい。**

TEL 0773-25-1860（休日・夜間は転送されます）　FAX 0773-25-1861