

どこで発生してもおかしくない状況が続いています！

～消石灰散布や鶏舎出入時の消毒等、予防対策を徹底して下さい～

➤ 佐賀県で高病原性鳥インフルエンザ発生（国内26例目（佐賀県1例目））


高病原性鳥インフルエンザ発生状況（R4年シーズン）

★ 家きん（16道県26事例）

疫学関連農場

都道府県	発生戸数	飼養羽数
岡山県	3 戸	約 71.4 万羽
北海道	2 戸	約 32.0 万羽
香川県	3 戸	約 7.8 万羽
茨城県	1 戸	約 104.0 万羽
和歌山県	2 戸	約 4.6 万羽
兵庫県	1 戸	約 4.4 万羽
鹿児島県	5 戸	約 81.4 万羽
新潟県	1 戸	約 15.0 万羽
宮崎県	1 戸	約 16.0 万羽
青森県	1 戸	約 12.2 万羽
宮城県	1 戸	約 2.1 万羽
千葉県	1 戸	約 20 羽
福島県	1 戸	約 1.7 万羽
鳥取県	1 戸	約 11.0 万羽
愛知県	1 戸	約 31.0 万羽
佐賀県	1 戸	約 3.0 万羽
計	26 戸	約 397.6 万羽

都道府県	発生戸数	飼養羽数
新潟県	1 戸	約 0.6 万羽
青森県	1 戸	約 0.8 万羽
香川県	3 戸	約 2.9 万羽
鹿児島県	1 戸	約 0.8 万羽
計	6 戸	約 5.1 万羽



国内26例目【佐賀県武雄市】
採卵鶏 約3万羽

● 野鳥等（15道県91事例）
神奈川県、宮城県、福井県、北海道、新潟県、鹿児島県、香川県、宮崎県、山形県、秋田県、和歌山県、兵庫県、岩手県、長崎県、富山県

予防対策を徹底して下さい。

- ◆ 消毒の徹底（鶏舎出入り時の手指・長靴消毒、鶏舎周囲に消石灰散布等）
- ◆ 野生動物対策（ネットやカーテンの設置・破損の有無の点検・修繕等）
- ◆ 専用靴等の設置（鶏舎専用の靴・衣服の設置等）

死亡羽数が増える等の異状が見られたら、すぐに連絡して下さい。