

# 高病原性鳥インフルエンザが続発しています！

～最大限の警戒をお願いします～

➤ 福岡県で高病原性鳥インフルエンザ発生（国内48例目（福岡県2例目））

## 高病原性鳥インフルエンザ発生状況（R4年シーズン）

★ 家きん（22道県48事例）


都道府県	発生戸数	飼養羽数	都道府県	発生戸数	飼養羽数
岡山県	4 戸	約 73.7 万羽	千葉県	1 戸	約 20 羽
北海道	2 戸	約 32.0 万羽	福島県	2 戸	約 11.7 万羽
香川県	4 戸	約 15.8 万羽	鳥取県	1 戸	約 11.0 万羽
茨城県	2 戸	約 115.0 万羽	愛知県	2 戸	約 31.1 万羽
和歌山県	2 戸	約 4.6 万羽	佐賀県	1 戸	約 3.0 万羽
兵庫県	1 戸	約 4.4 万羽	山形県	1 戸	約 2.7 万羽
鹿児島県	12 戸	約 132.1 万羽	広島県	2 戸	約 30.7 万羽
新潟県	1 戸	約 15.0 万羽	沖縄県	1 戸	約 4.5 万羽
宮崎県	2 戸	約 21.0 万羽	埼玉県	1 戸	約 19.4 万羽
青森県	2 戸	約 149.2 万羽	<b>福岡県</b>	<b>2 戸</b>	<b>約 9.0 万羽</b>
宮城県	1 戸	約 2.1 万羽	長崎県	1 戸	約 2.7 万羽
			計	48 戸	約 690.7 万羽

### 疫学関連農場

都道府県	発生戸数	飼養羽数
新潟県	1 戸	約 0.6 万羽
青森県	1 戸	約 0.8 万羽
香川県	3 戸	約 2.9 万羽
鹿児島県	2 戸	約 8.2 万羽
山形県	1 戸	約 4.0 万羽
愛知県	1 戸	約 0.1 万羽
宮崎県	1 戸	約 10.0 万羽
計	10 戸	約 26.6 万羽

国内48例目

【福岡県糸島市】肉用鶏 約3.6万羽



● 野鳥等  
23道県131事例

予防対策を徹底して下さい。

- ◆ 消毒の徹底（鶏舎出入り時の手指・長靴消毒、鶏舎周囲に消石灰散布等）
- ◆ 野生動物対策（ネットやカーテンの設置・破損の有無の点検・修繕等）
- ◆ 専用靴等の設置（鶏舎専用の靴・衣服の設置等）

死亡羽数が増える等の異状が見られたら、すぐに連絡して下さい。