


# 三重県の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜を確認！（今シーズン16例目）

➤ 農場の消石灰散布・入場時の消毒等、予防対策の徹底を！

## 高病原性鳥インフルエンザ発生状況（令和7年シーズン）

★ 家きん飼養農場での発生（11道府県16事例）

都道府県	発生戸数	飼養羽数		
北海道	3 戸	約 70.1 万羽	採卵鶏	
新潟県	2 戸	約 91 万羽	採卵鶏	
宮崎県	2 戸	約 5.4 万羽	肉用・採卵鶏	
鳥取県	1 戸	約 7.5 万羽	肉用鶏	
兵庫県	2 戸	約 39.5 万羽	採卵鶏	
岡山県	1 戸	約 43 万羽	採卵鶏	
京都府	1 戸	約 28 万羽	採卵鶏	
茨城県	1 戸	約 97 万羽	採卵鶏	
埼玉県	1 戸	約 24 万羽	採卵鶏	
香川県	1 戸	約 2.4 万羽	採卵鶏	
三重県	1 戸	約 2.5 万羽	採卵鶏	
計	16 戸	約 410.4 万羽		



都道府県	事例数
北海道	25
宮崎県	9
山形県	1
鹿児島県	25
新潟県	2
福岡県	1
群馬県	1
福島県	1
大分県	1
高知県	1
徳島県	1
合計	68

- ① 衛生管理区域に立ち入る人・車両等の消毒、区域専用の衣服及び靴の設置
- ② 家きん舎に立ち入る人等の消毒、家きん舎ごとの専用の靴の設置
- ③ 野生動物の侵入防止のためのネット等の設置・点検及び修繕
- ④ 家きん舎周囲、飲水の消毒

### 予防対策

死亡羽数が増える等の異状が見られたら、すぐに下記まで連絡して下さい。

京都府南丹家畜保健衛生所TEL：0771-42-3308（夜間・休日も転送機能で連絡可能）