
韓国で口蹄疫が続発しています！

今一度、発生予防対策を徹底しましょう！

韓国では、2026年7月に口蹄疫の発生が確認されて以降、継続的に発生しており、**日本国内への侵入リスクが極めて高い状況が続いています**。改めて、発生予防対策の徹底をお願いします。

	発生日	場所		動物種	飼養頭数
1	’25/3/13	全南	靈岩郡	牛	184
2	’25/3/14	全南	靈岩郡	牛	15
β*	’25/3/14	全南	靈岩郡	牛	471
4	’25/3/14	全南	靈岩郡	牛	31
5	’25/3/15	全南	務安郡	牛	88
6	’25/3/17	全南	靈岩郡	牛	365
7	’25/3/17	全南	靈岩郡	牛	25
8	’25/3/17	全南	靈岩郡	牛	100
9	’25/3/18	全南	靈岩郡	牛	49
10	’25/3/18	全南	靈岩郡	牛	25
11	’25/3/19	全南	靈岩郡	牛	125
12	’25/3/19	全南	靈岩郡	牛	835
13	’25/3/20	全南	靈岩郡	牛	43
14	’25/3/23	全南	靈岩郡	牛	31
15	’25/4/10	全南	務安郡	豚	5,223
16	’25/4/10	全南	務安郡	豚	1,736
17	’25/4/12	全南	務安郡	豚	1,951
18	’25/4/12	全南	務安郡	豚	1,931
19	’25/4/13	全南	務安郡	豚	3,216
20	’26/1/30	仁川	江華郡	牛	246
21	’26/2/20	京畿	高陽市	牛	130
22	’26/2/28	京畿	高陽市	牛	168
23	’26/7/3	慶北	醴泉郡	豚	5,500
24	’26/7/3	慶北	醴泉郡	牛	186
25	’26/7/3	慶北	醴泉郡	牛	81
26	’26/7/3	慶北	醴泉郡	牛	130
27	’26/7/3	慶北	醴泉郡	牛	39
28	’26/7/3	慶北	醴泉郡	牛	72
29	’26/9/2※	慶北	醴泉郡	牛	46
30	’26/9/2※	慶北	醴泉郡	牛	86

出典：韓国農林畜産食品部、WOAH
注：日付はWOAH報告の発生日又は韓国当局発表の発生日（検体採取日）（※）
頭数は当該農場で飼養されている感受性動物数



2026年９月４日時点
農林水産省動物衛生課

仁川広域市（１件）
2026年１月30日
江華郡　牛：**1件（O型）**

京畿道（２件）
2026年２月20日
高陽市　牛：**1件（O型）**
2026年２月28日
高陽市　牛：**1件（O型）**

慶尚北道（８件）
2026年7月３日
醴泉郡　豚：**1件（O型）**
牛：**5件（O型）**
2026年９月２日※
醴泉郡　牛：**２件（血清型確認中）**

全羅南道（19件）
2025年3月13日（確定日は14日）
靈岩郡　牛：**1件（O型）**
2025年3月14日（確定日は15日）
靈岩郡　牛：**3件（O型）**
2025年3月15日（確定日は16日）
務安郡　牛：**1件（O型）**
2025年3月17日
靈岩郡　牛：**3件（O型）**
2025年3月18日
靈岩郡　牛：**2件（O型）**
2025年3月19日
靈岩郡　牛：**2件（O型）**
2025年3月20日
靈岩郡　牛：**1件（O型）**
2025年3月23日
靈岩郡　牛：**1件（O型）**
2025年４月10日
務安郡　豚：**2件（O型）**
2025年４月12日
務安郡　豚：**2件（O型）**
2025年４月13日
務安郡　豚：**1件（O型）**

発生予防対策の徹底をお願いします！

- ☐ 農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外の立入を制限**しましょう。
- ☐ 農場の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用**し、**手指を消毒**するとともに、持ち込む**物品**や**出入りする車両の消毒を徹底**しましょう。
- ☐ **畜舎専用の靴の着用**や**畜舎出入口に踏込消毒槽等を設置**することにより、出入りする人の**靴底の消毒を徹底**しましょう。
- ☐ 従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控える**とともに、**これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないようにしましょう**。
- ☐ **毎日、飼養家畜の健康観察**を行い、**疑わしい症状があれば直ぐに通報**しましょう。



裏面もチェック！

専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

・　衛生管理区域に立ち入る場合には、専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施しましょう。

・　畜舎ごとに専用の靴または踏込消毒を設置し、使用しましょう。



専用の服や靴の使用、手指消毒

◎効果的な消毒のポイント

・　踏込消毒槽の消毒液は、汚れで効果が薄れるので、まずは汚れを落としてから消毒しましょう。また、消毒薬が汚れていたら、直ちに交換しましょう。



推奨される踏込消毒槽の設置方法

②消毒液の槽

①水洗の槽



汚れをしっかり落としてから消毒

・　農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤのみを消毒するのではなく、泥よけの内側部分まで消毒し、衛生管理区域内で降車する場合は農場専用のフロアマット等の使用や車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒を実施しましょう。



車両はタイヤだけでなく、**泥よけの内側**まで消毒し、**フロアマットの交換**や**ペダル等車内も消毒**

≪要注意≫

★　逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適です！

★　消毒効果が弱まるので、酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと！

疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛、豚、山羊、めん羊などで発熱や食欲不振に始まり、泡状のよだれを流したり、口、鼻、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）ができるのが特徴です。

～牛の症状～





鼻のびらん

～豚の症状～



鼻の水泡



水疱が破れている

毎日必ず健康観察し、これらの症状を見つけ次第、直ちに獣医師や最寄りの家畜保健衛生所に連絡しましょう。

牛では、１頭のみに着目せず、泡状のよだれを多く流している個体が多い、上記の症状が急速に拡がるなど、群としての異状の有無を確認することが重要です。

京都府南丹家畜保健衛生所　　南丹市八木町木原北東庄１８
TEL：0771-42-3308（休日・夜間は転送されます）　FAX：0771-42-5117