

## 新型コロナウイルス感染症における経口薬について

	ラゲブリオ (モルヌピラビル)			パキロビッドパック (ニルマトレルビル/リトナビル)		
承認日	令和3年12月24日			令和4年2月10日		
効能・効果	SARS-CoV-2による感染症					
投与対象	重症化リスク因子を有する等、本剤の投与が必要と考えられる患者					
用法用量	18歳以上の患者には、  モルヌピラビルとして1回800mg  を  1日2回、5日間経口投与 (1回4カプセルを服用)			成人及び12歳以上かつ体重40kg 以上の小児には、 ニルマトレルビルとして1回300mg (中等度の腎機能障害患者は150mg) 及びリトナビルとして1回100mg を同時に  1日2回、5日間経口投与 (1回2種類計3錠を服用)		
用法及び用量 に関連する注意	○症状が発現してから速やかに投与を開始すること。 ○症状発現から6日目以降に投与を開始した患者における有効性を裏付けるデータは得られていない。					
禁忌	○妊娠又は妊娠している可能性のある女性			○高血圧や高脂血症、不眠症などの治療に使われている薬剤を投与中の患者 ○腎機能又は肝機能障害がある患者で、コルヒチンを投与中の患者		
供給方法	○医療機関での院内処方(無床診療所の院内処方も可) ○医療機関で院外処方し、薬局が交付			○医療機関での院内処方(無床診療所の院内処方は不可) ○医療機関で院外処方し、薬局が交付		
登録機関数 [単位:施設] (R4.4.15時点)	全 国	医療機関	29,045	全 国	医療機関	3,082
		薬 局	20,095		薬 局	285
	京都府	医療機関	745	京都府	医療機関	70
		薬 局	390		薬 局	6
投与実績 [単位:人分] (R4.4.15時点)	全 国	医療機関	65,562	全 国	医療機関	4,423
		薬 局	87,192		薬 局	119
	京都府	医療機関	1,824	京都府	医療機関	139
		薬 局	2,609		薬 局	1