

# 国内養鶏場で高病原性鳥インフルエンザ疑似患畜を確認(国内12~15例目)

**宮崎県**  
 12/1 日向市  
 肉用鶏 約4万羽 H5亜型  
new  
 12/2 都農町 12例目  
 肉用鶏 約3万羽 H5亜型  
 12/3 都城市 15例目  
 肉用鶏 約3.6万羽 H5亜型

10/30  
 北海道紋別市  
 野鳥糞便  
 H5N8検出


**兵庫県(養鶏場)**  
 11/25 淡路市  
 採卵鶏 約14.6万羽  
 H5N8亜型

11/25,30  
 新潟県阿賀野市  
 野鳥糞便  
 環境(水)  
 H5N8検出

**福岡県(養鶏場)**  
 11/25 宗像市  
 肉用鶏約9.4万羽 H5N8亜型

**香川県(養鶏場)**  
 11/4,11,13,15,20,21  
 三豊市 H5N8亜型  
 11/7 東かがわ市 H5N8亜型  
new  
 12/2 三豊市 H5亜型  
 13例目採卵鶏 約22.8万羽  
 疫学関連農場 約12.5万羽  
 14例目採卵鶏 約2万羽

11/13,20: 鹿児島県出水市  
 環境(水)からH5N8検出  
 11/17 : 鹿児島県出水市  
 野鳥糞便からH5N8検出



◆鶏舎毎の長靴交換や消毒だけでなく、履き替え時に動線が交差しないようにするなど、これまでよりさらに徹底した対策を講じる必要があります。

◆野鳥・野生動物の侵入防止、鶏舎周りの消毒等、飼養衛生管理基準を徹底し、異常を認めた場合には直ちに家畜保健衛生所への通報をお願いします。

◆丹後家畜保健衛生所HPで随時情報更新中  
<http://www.pref.kyoto.jp/tango-kaho/index.html>

